



**Laboratoire d'épidémiologie
Médecine Préventive Hospitalière
BH/19/101
1011 Lausanne PP – 457
tél. 021 314 02 60 (culture)
021 314 90 94 (test rapide)**

Heures d'ouverture:

Lundi à samedi: 08h00 12h00 et de 13h00 à 17h00
Dimanche: 13h00 à 16h30

En dehors des heures d'ouverture: mettre les prélèvements au frigo

Nom et prénom
du patient

DITO

Adresse

NP Localité

Date de naissance:

Sexe: M F

Copie à:

Prélèvement(s):

Effectué(s) le (date) à (heure)

pour recherche de:

Motivations (cocher une seule case) c: culture ; p: PCR (test rapide)

MRSA

Frottis de nez & gorge & aine



Autres
(p.ex. sites anciennement positifs)



Indications standards:

- c/p Alerte Algerme
- p Séjour antérieur dans un établissement de soins à haute prévalence MRSA (étranger, CHUV, HUG, tessinois, EMS, enfant d'un programme humanitaire) :
- p Voisin de chambre/box du patient IPP :
- c Dépistage unité de soins (y.c. dépistage hebdomadaire)

Indications spécifiques:

- p Entrée aux SIA, ou transfert de CCV au bloc Op
- p Sortie des SIA vers un autre service
- p Sortie d'un service en épidémie vers un autre service du CHUV ou vers un autre établissement de soins
- p Transfert du CHUV vers un CTR
- c Autre:

VRE

Frottis rectal
 Frottis de selles



- c Alerte Algerme
- c Transfert ou séjour dans un établissement de soins étranger ou à risque, enfant d'un programme humanitaire:
- c Voisin de chambre/box du patient IPP :
- c Dépistage unité de soins
- c 2^{ème} dépistage
- p 3^{ème} dépistage

ESBL/ CRE (Carbapénèmase)

Frottis rectal
 Autres :



- c Alerte Algerme
- c Transfert ou séjour dans un établissement de soins étranger ou dans le sous-continent indien, enfant d'un programme humanitaire:
- c Voisin de chambre/box du patient IPP :
- c Dépistage unité de soins
- c Autre:

Acinetobacter

Frottis de gorge
 Frottis rectal
 Autres :



- Uniquement pour patients hospitalisés aux SIA:
- c Transfert ou séjour dans un établissement de soins étranger :
 - c Autre:

Procédure d'échantillonnage:

Respecter les mesures d'hygiène et de désinfection des mains

1. Frottis de nez (premier écouvillon rouge)


- Mouiller l'écouvillon avec une solution physiologique (0.9 % NaCl)
- Écouvillonner les deux narines en tournant 3-4 fois l'écouvillon sur une profondeur maximum de 1-2 cm
- Soit:
 - Insérer l'écouvillon directement dans le milieu liquide et le laisser pendant au minimum 5 secondes.
 - Garder l'écouvillon dans le milieu et l'agiter en le tournant entre le pouce et l'index
 - Presser l'extrémité (éponge) de l'écouvillon contre la paroi en le tournant pour ôter le liquide restant.
 - Jeter l'écouvillon



Soit: casser l'écouvillon dans le tube


2. Frottis de gorge (deuxième écouvillon rouge)

- Presser et tourner l'écouvillon contre les amygdales et le fond de la gorge.
- Procéder de la même manière qu'au point C du frottis de nez



3. Frottis du pli de l'aîne (écouvillon blanc)

- Mouiller l'écouvillon avec une solution physiologique (0.9 % NaCl)
- Frotter les deux plis de l'aîne en tournant l'écouvillon. Attention à ne pas inclure des selles (peut causer des interférences avec le test)
- Casser l'écouvillon blanc au point de marquage et laisser l'écouvillon dans le tube** (il contient des substances nécessaires à la stabilité du prélèvement). Fermer le tube avec le capuchon à vis.



Frottis rectal

- Insérer l'écouvillon dans le rectum, tourner 2X et le retirer
- Insérer l'écouvillon dans le tube, le casser au point de marquage **et le laisser dans le tube** (il contient des substances nécessaires à la stabilité du prélèvement). Fermer le tube avec le capuchon.

