

1. LAVAGE DU CHAMP OPERATOIRE

PRINCIPES

EN SALLE D'ANESTHESIE

AU PLUS TOT DANS L'HEURE QUI PRECEDE L'INTERVENTION

APRES LE RASAGE DU CHAMP OPERATOIRE SI INDISPENSABLE

AVEC UN SAVON ANTISEPTIQUE

1 ^{er} choix	Savon désinfectant	Principe actif : chlorhexidine
2 ^{ème} choix	Savon désinfectant	Principe actif : polyvidone iodée Indication : allergie à la chlorhexidine
3 ^{ème} choix	Savon désinfectant	Principes actifs : ammonium quaternaire et alcool Indication : allergie à la chlorhexidine et à l'iode
Traumatologie	Eau oxygéné	Indication : lavage des plaies sales

TECHNIQUE

Détersion

- Désinfection des mains avec solution ou gel hydro-alcoolique
- Ouvrir le paquet stérile contenant cuvette compresses et/ou tampons
- Verser de l'eau stérile dans la cuvette
- Verser le savon désinfectant dans la cuvette
- Mettre des gants stériles
- Imbiber une compresses et/ou tampons d'eau stérile et de savon antiseptique
- Appliquer la compresse et/ou tampons en cercles, en commençant par la ligne d'incision et en tenant compte de l'éventuelle mise en place de drains
- Faire mousser jusqu'à ce que la mousse se décolore
- Répéter les phases 6 à 9 pendant 2 minutes en changeant de compresse

Rinçage

- Imbiber une compresse d'eau stérile
- Rincer circulairement en commençant par la ligne d'incision
- Répéter autant de fois que nécessaire en changeant de compresse

Séchage

- Tamponner en cercle avec des compresses et/ou tampons stériles en commençant par la ligne d'incision
- Couvrir la zone lavée avec des champs stériles

2. ANTISEPSIE DE LA PEAU

PRINCIPES

EN SALLE D'OPERATION

IMMEDIATEMENT AVANT L'INTERVENTION

APRES LE LAVAGE DU CHAMP OPERATOIRE SI INDISPENSABLE

AVEC UNE SOLUTION ANTISEPTIQUE

Teinture colorée	Principes actifs : chlorhexidine 0.5% et alcool isopropylique Indication : patient allergique à l'iode, pathologie thyroïdienne
Teinture colorée	Principes actifs : polyvidone iodée et alcool isopropylique Indication : patient allergique à la chlorhexidine
Alcool éthylique 70%	Principe actif : alcool éthylique Indication : patient allergique à l'iode et à la chlorhexidine
Solution aqueuse	Principes actifs : chlorhexidine 0.5% Indication : muqueuse et plaie; patient allergique à l'iode, pathologie thyroïdienne
Solution aqueuse	Principes actifs : polyvidone iodée Indication : muqueuse et plaie; patient allergique à la chlorhexidine

TECHNIQUE

1. Préparer un set de désinfection contenant pinces, compresses et/ou tampons, cupules
2. Verser le désinfectant dans la cupule
3. Mettre des gants stériles
4. Au moyen d'un tampon stérile et/ou compresses stériles et d'une pincette stérile, appliquer circulairement en commençant par la ligne d'incision et en tenant compte de l'éventuelle mise en place de drains. **Laisser sécher**. Ne jamais tremper compresse et/ou tampons utilisés dans la solution antiseptique, mais les changer
5. Au moyen d'un nouveau tampon stérile et/ou compresses stériles procéder à une 2^{ème} application. **Laisser sécher**
6. Au moyen d'un nouveau tampon stérile et/ou compresses stériles procéder à une 3^{ème} application
7. **Laisser sécher** avant de procéder au champage (ne pas tamponner)
8. Seules les zones où le champ sera collé peuvent être séchées
9. Attention aux excès de produits, dangereux car altère la sécurité électrique du patient