

## PRECAUTIONS STANDARD DIALYSE

Les « **Précautions Standard** » ont fait l'objet d'un document spécifique élaboré par l'Unité HPCI. Ce document dénombre 10 précautions standard :

1. Hygiène des mains
2. Port de gants
3. Port de masque et de lunettes de protection ou d'un masque à visière
4. Port d'une blouse de protection
5. Traitement des dispositifs médicaux
6. Traitement du linge
7. Gestion des déchets à risque infectieux
8. Traitement de l'environnement
9. Protection du personnel
10. Placement du patient

Le respect de chacune de ces précautions nécessite la mise en application d'un certains nombres d'actions détaillées dans le document sus-mentionné.

Or, du fait d'un risque élevé de contamination par du sang ou d'autres liquides biologiques en hémodialyse, une attention particulière doit être apportée à la prévention de la contamination par des virus transmissibles par voie sanguine dans ces unités ; les actions qui en découlent représentent les « **Précautions Standard Dialyse** ». La suite de ce document insiste donc sur ces actions et n'annule en rien les recommandations émises dans le document « **Précautions Standard** ». Afin d'être exhaustif, deux rubriques supplémentaires ont dû être ajoutées à la liste des Précautions standard, à savoir :

11. Préparation et distribution des injectables
12. Manipulation et stockage du matériel

### **1. Hygiène des mains**

Application selon le document « **Précautions Standard** » élaboré par l'Unité HPCI et :

- Désinfection des mains après tout contact avec le générateur d'hémodialyse.

### **2. Port de gants**

Application selon le document « **Précautions Standard** » élaboré par l'Unité HPCI et :

- Port de gants à usage unique lors de tout contact avec le patient ou son environnement direct dès le branchement et jusqu'au départ du patient. En dehors de la période de branchement et de débranchement, le port de gants lors de la seule manipulation du tableau de bord du générateur d'hémodialyse n'est pas exigé si ce dernier est systématiquement désinfecté après chaque intervention.
- Changer de gants et se désinfecter les mains entre 2 patients ou 2 postes de dialyse.
- Disposer des boîtes de gants à chaque poste de dialyse.

### **3. Port d'un masque et de lunettes de protection ou d'un masque à visière**

Application selon le document « **Précautions Standard** » élaboré par l'Unité HPCI et :

- Port d'un masque et de lunettes de protection ou d'un masque à visière lors du branchement, du débranchement, du démontage du circuit de dialyse et lors de toute rupture de continuité du circuit extra-corporel en cours de traitement.

#### 4. Port d'une blouse de protection

Application selon le document « **Précautions Standard** » élaboré par l'Unité HPCI et :

- Port d'une blouse de protection lors du branchement, du débranchement, du démontage du circuit de dialyse et lors de toute rupture de continuité du circuit extra-corporel en cours de traitement.

#### 5. Gestion du matériel de soins et traitement des dispositifs médicaux

Application selon le document « **Précautions Standard** » élaboré par l'Unité HPCI et :

- Utiliser de préférence du matériel de soins à usage unique.
  - Ex : bandes de compression à usage unique
- Si l'utilisation de matériel à usage unique n'est pas possible :
  - Dédier le matériel à usage multiple à un seul patient en cours de dialyse
    - Ex : tensiomètre, brassard, thermomètre, glucomètre, garrot...etc
  - Désinfecter le matériel de soins à usage multiple entre 2 patients
    - Ex : tensiomètre, brassard, thermomètre, glucomètre, garrot...etc (**Fiche technique : Entretien du poste de dialyse au départ du patient**).
- Utiliser de préférence du matériel de soins et de traitement en mono-doses. Dans le cas contraire, préparer le matériel de soins et de traitement en multi-doses dans une zone propre à l'écart des postes de dialyse.
  - Ex : ruban adhésif, tampons hémostatiques
- Jeter le matériel de soins et de traitement en mono-doses et le matériel de soins à usage unique non utilisé qui a stationné à un poste de dialyse. Ne pas l'utiliser pour un autre patient et ne pas le retourner dans une zone propre, à moins qu'il soit emballé et que l'emballage soit désinfectable.
  - Ex : bandes de compression à usage unique, ruban adhésif, tampons hémostatiques, tampons de désinfection, compresses, matériel d'injection (seringues, aiguilles), ...etc

#### 6. Traitement du linge.

Application selon le document « **Précautions Standard** » élaboré par l'Unité HPCI et :

- Ne pas conserver les draps de lit et couvertures d'une séance à l'autre.

#### 7. Gestion des déchets à risques infectieux

Application selon le document « **Précautions Standard** » élaboré par l'Unité HPCI.

#### 8. Traitement de l'environnement

Application selon le document « **Précautions Standard** » élaboré par l'Unité HPCI et :

- Désinfecter et nettoyer l'ensemble du poste de dialyse au départ du patient (**fiche technique : Entretien du générateur au départ du patient**).

#### 9. Protection du personnel

Application selon le document « **Précautions Standard** » élaboré par l'Unité HPCI et :

- Le personnel non immunisé ne devrait pas administrer de traitement d'hémodialyse à des patients HBsAg positifs.

#### 10. Placement du patient

Application selon le document « **Précautions Standard** » élaboré par l'Unité HPCI.

#### 11. Préparation et distribution des injectables

- Délimiter clairement les zones propres destinées à la préparation des solutions médicamenteuses, les séparer des postes de dialyse et des zones sales où se trouve le matériel contaminé.

- Lors de l'utilisation de préparations médicamenteuses multi-doses, préparer les doses individuelles dans une zone propre séparée des postes de dialyse et les délivrer individuellement à chaque patient. Ne pas faire circuler des ampoules multi-doses entre les postes de dialyse.
- Une solution médicamenteuse ou du matériel d'injection apporté à un poste de dialyse et non utilisé ne devrait pas être utilisé pour un autre patient.
- Ne pas disposer de chariot pour la préparation et la distribution des solutions médicamenteuses dans la zone de traitement.
- En cas d'utilisation de plateaux de distribution, désinfecter les plateaux entre chaque patient.
- Ne pas mettre d'ampoules, de seringues, de tampons ou d'autre matériel d'injection dans les poches.
- Ne pas manipuler de matériel contaminé dans les zones propres où les solutions médicamenteuses sont préparées.

### **12. Manipulation et stockage du matériel**

- Délimiter clairement les zones propres destinées au stockage du matériel de soins et les séparer des zones sales où se trouve le matériel contaminé.
- En cas d'utilisation d'un chariot pour le stockage de matériel propre dans la zone de traitement, stationner ce chariot dans un endroit précis à l'écart des postes de dialyse ; ce chariot ne doit pas circuler entre les différents postes de dialyse.
- Ne pas manipuler de matériel contaminé dans les zones propres où le matériel est stocké.

### **VALIDATION**

**Ce document élaboré par l'Unité HPCI en collaboration avec les cellules régionales HPCI et les différents centres de dialyse du canton de Vaud, sous l'expertise du SMPH, CHUV, a été révisé en mars 2007. Ce document est en vigueur dans les services de dialyse chronique du canton de Vaud.**