



Investigation d'un portage de VRE

L'investigation du portage de la bactérie se fait par l'intermédiaire de trois dépistages hebdomadaires successifs (J0, J7, J14) par écouvillonnage rectal.

Ce dépistage a été débuté au cours de l'hospitalisation et doit être poursuivi jusqu'à ce qu'on dispose de 3 prélèvements successifs à raison d'un dépistage par semaine (y compris les prélèvements déjà réalisés à l'hôpital).

Le laboratoire devant s'équiper du matériel nécessaire pour effectuer l'analyse des prélèvements de dépistage (24-48h de délai pour la réception du matériel nécessaire), il est impératif de s'assurer que le laboratoire responsable de la microbiologie puisse prendre en charge ce type de recherche

Frottis de dépistage – technique

<p>Matériel</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Écouvillon sec stérile - Solution hydro alcoolique - Gants à usage unique 	
<p>Technique</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Se désinfecter les mains avec la solution hydro alcoolique - Mettre des gants - Ouvrir le sachet - Sortir le tube et l'écouvillon - Installer le résident sur le côté - Enfoncer environ 3-5 cm l'écouvillon dans le rectum et faire un mouvement circulaire - Ouvrir le tube et y mettre l'écouvillon - Refermer le tube - Coller une étiquette d'identification du résident et - Remplir le bon de laboratoire en y indiquant la date et le motif du prélèvement (<i>dépistage VRE</i>) 	

Planning des dépistages (à compléter) :

Nom/Prénom Résident	Date de naissance	Date 1 ^{er} dépistage	Résultat	Date 2 ^{eme} dépistage	Résultat	Date 3 ^{eme} dépistage	Résultat
.....
.....