

Patient contact lettre médecin

Cher collègue,

Lors de son séjour dans notre établissement, Monsieur/ Madame \_\_\_\_\_ a été hospitalisé dans la même unité qu'un autre patient dépisté (frottis rectal) porteur au niveau du tube digestif d'un entérocoque résistant aux glycopeptides (Vancomycine et Teicoplanine).

Votre patient a donc été en contact avec un autre patient porteur de cette bactérie peu pathogène, mais très épidémiogène et à ce titre, il a pu être colonisé à son tour par un mécanisme de contamination croisée.

Afin d'éliminer cette éventualité, trois dépistages hebdomadaires successifs par écouvillonnage rectal sont nécessaires. Ils ont été débutés au cours de l'hospitalisation et doivent être poursuivis (prélèvements organisés en collaboration avec le patient) jusqu'à ce qu'on dispose d'un total de 3 prélèvements successifs à raison d'un dépistage par semaine (y compris les prélèvements déjà réalisés à l'hôpital).

Actuellement, les prélèvements suivants ont été réalisés aux dates suivantes :

- J1 : \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ , résultat : positif      négatif
- J8 : \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ , résultat : positif      négatif
- J15 : \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ . résultat : positif      négatif

En l'absence de 3 prélèvements négatifs, votre patient sera placé en chambre seul et des Mesures Additionnelles contact seront mises en place (port de surblouse et gants par le personnel) en cas de réhospitalisation.

En cas de transfert de votre patient dans un autre établissement de soins (hôpital, CTR, EMS) ou de soins ambulatoires, nous vous demandons de prévenir l'établissement et de transmettre ce document de liaison afin que les mesures appropriées soient mises en place.

En vous remerciant de votre collaboration nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire