

1. Facteurs de risque retenus pour déterminer le « patient à risque »

- Patient ayant séjourné dans un établissement dans une zone avec haute endémie de MRSA, c'est à dire taux de MRSA / S. aureus >25% selon les statistiques disponibles (patient transféré d'hôpitaux étrangers ou avec un séjour antérieur remontant < 2 mois, patient transféré des hôpitaux universitaires genevois=HUG ou avec un séjour antérieur remontant < 2 mois, enfants provenant d'organismes humanitaires).
- Voisin de chambre, c'est à dire : patient ayant séjourné pendant >24 h dans la même chambre qu'un patient source pendant les 7 jours précédant le 1^{er} prélèvement positif de ce patient .
- Patient connu comme ayant été colonisé par du MRSA et sans décolonisation documentée (soit au minimum 2 sets de prélèvements ultérieurs négatifs).

2. Facteurs de risque retenus pour la mise en place de mesures additionnelles (isolement de contact ou précautions de contact)

- Patient avec transfert d'un établissement avec haute endémie de MRSA (hôpitaux étrangers, hôpitaux universitaires genevois=HUG, enfants provenant d'organismes humanitaires) **et hospitalisé** dans un service à haut risque c'est à dire **aux soins intensifs ou service de brûlés**.
- Patient connu comme ayant été colonisé par du MRSA et sans décolonisation documentée (soit au minimum 2 sets de prélèvements ultérieurs négatifs).

3. Facteurs de risque d'infection chez un patient colonisé par MRSA retenus pour une décolonisation

- Diabète, tumeurs malignes, insuffisance rénale chronique, traitement immunosuppresseur.
- Patient en dialyse.
- Présence de dispositifs médicaux (sonde vésicale, cathéter, port-à-cath, sonde de jéjunostomie, etc.).
- Intervention chirurgicale récente (< 1 mois) ou programmée.
- Présence de plaies.
- Patient hospitalisé en soins aigus ou en CTR.