

Tableau synthétique des Mesures Additionnelles aux Précautions Standard (PS) - Secteurs ambulatoires non interventionnels

Exemples : URG-06, policliniques, radiologie, médecine nucléaire, dialyse chronique, angiologie, consultation d'oncologie, etc. *

Exemples	Pour tous les patients	Bactéries multi-R : MRSA, VRE, ESBL, carbapénémase, <i>Pseudomonas</i> ou <i>Acinetobacter</i> multiR <i>Candida auris</i> Cas contacts VRE ou carbapénémase	<i>Clostridioïdes</i> <i>difficile</i> Gale	Norovirus	Grippe, COVID, autres virus respiratoires Infections respiratoires à MRSA, VRE, ESBL, carbapénémase, <i>Pseudomonas</i> ou <i>Acinetobacter</i> multi-R	Tuberculose pulmonaire Tuberculose extra pulm. avec geste invasif Rougeole	VZV : Varicelle, zona disséminé
Cas documenté ou suspicion							
Mesures	PRECAUTIONS STANDARD (PS)					AEROSOL 	AEROSOL + CONTACT 
Hygiène des mains	Selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique						
Salle d'attente	Mettre à l'écart les patients avec des signes d'infection Si symptômes respiratoires : port du masque de soins pour le patient					Eviter la salle d'attente Faire porter un masque de soins au patient dès l'admission	Eviter la salle d'attente Faire porter un masque de soins au patient dès l'admission
Placement du patient	Pas de recommandation particulière					Box individuel Fermer les portes (Eviter les appels d'air)	Box individuel Fermer les portes (Eviter les appels d'air)
Signalétique sur la porte	Pas de signalétique particulière					Oui	Oui
Equipements de protection : • Masque de soins	Si risque de projections de liquides biologiques Lors de symptômes respiratoires (étiquette respiratoire)				Masque FFP2 lors de procédures générant des aérosols en cas de virus respiratoires	Oui, masque FFP2 à mettre et à retirer dans le couloir Faire un fit-check avant d'entrer	Oui, masque FFP2 à mettre et à retirer dans le couloir Faire un fit-check avant d'entrer
• Surblouse	Si risque de projections de liquides biologiques						
• Gants	Si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses et peau lésée						
• Lunettes de protections	Si risques de projections de liquides biologiques						
Matériel de soins	Privilégier le matériel à usage unique Limiter au strict minimum le stock de matériel et consommables dans les box/salles						

Exemples : Cas documenté ou suspicion	Pour tous les patients	Bactéries multi-R : MRSA, VRE, ESBL, carbapénémase, <i>Pseudomonas</i> ou <i>Acinetobacter</i> multiR <i>Candida auris</i> Cas contacts VRE ou carbapénémase	<i>Clostridioides difficile</i> Gale	Norovirus	Grippe, COVID, autres virus respiratoires Infections respiratoires à MRSA, VRE, ESBL, carbapénémase, <i>Pseudomonas</i> ou <i>Acinetobacter</i> multiR	Tuberculose pulmonaire Tuberculose extra pulm. avec geste invasif Rougeole	VZV : Varicelle, zona disséminé
---	-------------------------------	---	---	-----------	--	---	------------------------------------

Au départ du patient

Si hospitalisation : avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates

Mesures	PRECAUTIONS STANDARD (PS)	AEROSOL 	AEROSOL + CONTACT 
Particularités		Port du masque de soins par le patient	Port du masque de soins par le patient
Temps de repos du box		Après le départ du patient, attendre 30 min. avant de réutiliser le box	Après le départ du patient, attendre 30 min. avant de réutiliser le box
Matériel de soins	A nettoyer et désinfecter entre chaque patient		
Table de consultation / d'examen	Désinfection avec des lingettes à base d'alcool 1x/jour si protégée par un linge ou papier à usage unique sinon entre chaque patient En cas de souillures visibles, utiliser les lingettes Incidin® Pro		
Barrières	A désinfecter entre chaque consultation		
Surfaces de travail (zone de travail)	A nettoyer et désinfecter après chaque utilisation avec des lingettes à base d'alcool Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être immédiatement nettoyées et désinfectées avec des lingettes Incidin® Pro		
Paravents	1x par jour avec des lingettes Incidin® Pro		
Rideaux	Selon protocole du service hôtelier		
Elimination des déchets	Elimination des déchets selon les filières habituelles		

*Le tableau décrit les recommandations HPCI dans leur généralité ; selon le contexte du service et les spécificités de la prise en charge clinique, ces mesures peuvent être adaptées en accord avec l'équipe HPCI

Références : [Guide romand "Précautions standard"](#) et [Guide romand «Mesures additionnelles aux précautions standard»](#) du site www.hpci.ch / referentiel