

Tableau synthétique des Mesures Additionnelles aux Précautions Standard (PS) - Secteurs ambulatoires interventionnels

Exemples : URGC, URGO, URGA, urgences pédiatriques, salles interventionnelles, USAN, endoscopie, consultation chirurgie septique, hôpitaux de jour, curiethérapie, etc *

Exemples :	Pour tous les patients	Bactéries multi-R : MRSA, VRE, ESBL, carbapénémase, <i>Pseudomonas</i> ou <i>Acinetobacter</i> multi-R <i>Candida auris</i> Cas contacts VRE ou carbapénémase	<i>Clostridioides difficile</i> Gale	Norovirus	Grippe, COVID, autres virus respiratoires Infections respiratoires à MRSA, VRE, ESBL, carbapénémase, <i>Pseudomonas</i> ou <i>Acinetobacter</i> multi-R	Tuberculose pulmonaire Tuberculose extra pulmonaire avec geste invasif Rougeole	VZV : Varicelle, zona disséminé
Cas documenté ou suspicion							
Mesures	Précautions Standard (PS)	CONTACT 	CONTACT + gants 	CONTACT + gouttelettes si vomissements 	GOUTTELETTES 	AEROSOL 	AEROSOL + CONTACT
Hygiène des mains	Selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique	Selon les PS	Selon les PS Lavage des mains à l'eau et au savon en sortant du box	Selon les PS	Selon les PS	Selon les PS	Selon les PS
Salle d'attente	Mettre à l'écart les patients avec des signes d'infection dans les lieux d'accueil Si symptômes resp.: port du masque pour le patient	Selon les PS	Selon les PS	Selon les PS	Selon les PS	Eviter la salle d'attente Faire porter un masque de soins au patient dès l'admission	Eviter la salle d'attente Faire porter un masque de soins au patient dès l'admission
Placement du patient		Box individuel Isolement géographique possible uniquement pour ESBL ou MRSA	Box individuel Isolement géographique (sanitaire dédié/chaise percée pour <i>C. difficile</i>)	Box individuel Sanitaire dédié/ chaise percée	Box individuel	Box individuel Fermer les portes (éviter les appels d'air)	Box individuel Fermer les portes (éviter les appels d'air)
Signalétique sur la porte		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Équipements de protection : • Gants	Si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses et peau lésée	Selon les PS	Oui, pour tout contact avec le patient	Selon les PS	Selon les PS	Selon les PS	Selon les PS
• Masque	Si risque de projections de liquides biologiques Lors de symptômes respiratoires	Selon les PS	Selon les PS	Selon les PS Si vomissements	Oui, masque de soins Masque FFP2 lors de procédures générant des aérosols en cas de virus respiratoires	Oui, masque FFP2 à mettre et à retirer dans le couloir ou le sas Faire un fit-check avant d'entrer	Oui, masque FFP2 à mettre et à retirer dans le couloir Faire un fit-check avant d'entrer
• Surblouse	Si risque de projections de liquides biologiques	Oui, lors de tout contact avec le patient	Oui, lors de tout contact avec le patient	Oui, lors de tout contact avec le patient	Oui, lors de tout contact avec le patient	Selon les PS	Oui, lors de tout contact avec le patient
• Lunettes de protection	Si risques de projections de liquides biologiques	Selon les PS	Selon les PS	Selon les PS	Selon les PS	Selon les PS	Selon les PS
Matériel de soins	Privilégier le matériel à usage unique Limiter au strict minimum le stock dans les salles	Selon les PS	Selon les PS	Selon les PS	Selon les PS	Selon les PS	Selon les PS

	Précautions Standard (PS)	CONTACT	CONTACT + gants	CONTACT + gouttelettes si vomissements	GOUTTELETTES	AEROSOL	AEROSOL + CONTACT
Au départ du patient							
Particularités						Pas de passage en salle de réveil Port d'un masque de soins par le patient	Pas de passage en salle de réveil Port d'un masque de soins par le patient
Temps de repos du box						Après le départ du patient, attendre 30 min. avant de réutiliser le box	Après le départ du patient, attendre 30 min. avant de réutiliser le box
Traitement du matériel de soins	A nettoyer et désinfecter entre chaque patient	Selon les PS	Selon les PS	Selon les PS	Selon les PS	Selon les PS	Selon les PS
Table de consultation / d'examen	Désinfection avec des lingettes à base d'alcool 1x/jour si protégée par un linge ou papier à UU sinon entre chaque patient En cas de souillures visibles, utiliser les lingettes Incidin® Pro	Désinfection avec : Incidin® Pro <i>Candida auris</i> : Tristel Fuse® Surfaces	Gale : Incidin® Pro <i>Clostridioides difficile</i> : Tristel Fuse® Surfaces	Désinfection avec : Tristel Fuse® Surfaces	Désinfection avec des lingettes à base d'alcool Pour les BMR, Désinfection avec : Incidin® Pro En cas de souillures visibles, utiliser les lingettes Incidin® Pro	Désinfection avec des lingettes à base d'alcool En cas de souillures visibles, utiliser les lingettes Incidin® Pro	Désinfection avec : Incidin® Pro
Barrières	A désinfecter entre chaque patient						
Surfaces de travail (zone de travail)	A nettoyer et désinfecter après chaque utilisation avec les lingettes à base d'alcool Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être immédiatement nettoyées et désinfectées avec des lingettes Incidin® Pro	Désinfection avec : Incidin® plus <i>Candida auris</i> : Tristel Fuse® Surfaces	Gale : Incidin® Pro <i>Clostridioides difficile</i> : Tristel Fuse® Surfaces	Désinfection avec : Tristel Fuse® Surfaces	Désinfection avec : Incidin® Pro	Désinfection avec : Incidin® Pro	Désinfection avec : Incidin® Pro
Désinfection des paravents	1x par jour avec des lingettes Incidin® Pro	Désinfection avec : Incidin® Pro <i>Candida auris</i> : Tristel Fuse® Surfaces	Gale : Incidin® Pro <i>Clostridioides difficile</i> : Tristel Fuse® Surfaces	Désinfection avec : Tristel Fuse® Surfaces	Désinfection avec : Incidin® Pro	Désinfection avec : Incidin® Pro	Désinfection avec : Incidin® Pro
Rideaux	Selon protocole du service hôtelier	Selon protocole du service hôtelier	Selon protocole du service hôtelier	Selon protocole du service hôtelier	Selon protocole du service hôtelier	Selon protocole du service hôtelier	Selon protocole du service hôtelier
Elimination des déchets	Elimination des déchets selon les filières habituelles	Selon les PS	Selon les PS	Selon les PS	Selon les PS	Selon les PS	Selon les PS

*Le tableau décrit les recommandations HPCI dans leur généralité ; selon le contexte du service et les spécificités de la prise en charge clinique, ces mesures peuvent être adaptées, en accord avec l'HPCI

Références : [Guide romand "Précautions standard"](#) et [Guide romand «Mesures additionnelles aux précautions standard»](#) du site www.hpci.ch / referentiel