

# Amibiase intestinale

Mise à jour  
09/10/2024Autres dénominations  
Entamoeba HistolyticaInformations relatives à  
Hôpitaux FHV, Cliniques, CTR / Toutes spécialités

## Epidémiologie

## Agent infectieux

*Entamoeba histolytica*

## Réservoir

Homme

## Mode de transmission



dans la communauté: par l'eau ou par les denrées alimentaires



à l'hôpital: éventuellement par l'intermédiaire des mains du personnel de cuisine qui manipulerait les denrées alimentaires en ne respectant pas les règles d'hygiène (rare)



transmission possible par endoscope mal nettoyé/désinfecté

---

## Période d'incubation

De 2 à 4 semaines. Dans les cas extrêmes: quelque jours ou plusieurs mois

---

## Durée d'infectiosité

Aussi longtemps que des amibes sont excrétées dans les selles

---

## Prise en charge du cas positif/suspect

### Précautions Standard + Mesures Additionnelles



L'application des Précautions Standard est suffisante



Instaurer des Mesures Additionnelles CONTACT si patient avec incontinence fécale ou non compliant aux mesures d'hygiène de base

---

## Placement

Chambre individuelle si Mesures Additionnelles CONTACT

---

## Mesures de protection/prévention pour le personnel

# Hygiène des Mains

Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydro-alcoolique (PHA)

---

## Gants



Non indiqués en systématique



A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

---

## Blouse de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Masque de soins

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Lunettes de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

# Nettoyage désinfection

## Matériel de soins



Dispositifs médicaux a usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque



Vaisselle : filière habituelle

---

## Lit et literie



Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre



Utiliser les sacs à linge usuels

---

## Environnement

Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien

---

## Déchets

Elimination des déchets selon les filières habituelles

---

## Déclaration du cas

# Mesures en cas d'épidémie

Toute diarrhée chez le personnel de cuisine colonisé/infecté doit être évaluée par la médecine du travail

---