HPCi | hygiène, prévention et contrôle de l'infection

Tétanos

PS

Mise à jour
30/10/2026

Autres dénominations
Clostridium Tetani

Informations relatives à
Hôpitaux FHV, Cliniques, CTR / Toutes spécialités

Epidémiologie

Agent infectieux

- *Clostridium tetani*

Réservoir

- Tube digestif des chevaux et autres animaux, mais également de l'homme.
- Environnement contaminé par des déjections

Mode de transmission

- Dans la communauté: dans 70% des cas, l'infection fait suite à une blessure contaminée par des spores de *C. tetani* particulièrement en présence de tissus dévitalisés ou de corps étrangers. Dans la moitié des cas, les blessures surviennent en plein air, alors que dans l'autre moitié, elles ont lieu à l'intérieur de la maison

A l'hôpital: pas de transmission si les mesures d'hygiène habituelles sont respectées

Période d'incubation

3 à 21 jours, en moyenne 10 jours. Les extrêmes peuvent aller de 1 jour à plusieurs mois

Durée d'infectiosité

Pas de transmission interhumaine

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

L'application des Précautions Standard est suffisante

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains

Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydroalcoolique

Gants

- Non indiqué en systématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

Blouse de protection

- Non indiqué en systématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (Si risque de projection de liquides biologiques)

Masque de soins

- Non indiqué en systématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (risque de projection de liquides biologiques ou lors de symptômes respiratoires)

Lunettes de protection

- Non indiqué en sytématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (risque de projection de liquides biologiques)

Nettoyage et désinfection

Matériel de soins

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel
- Dispositifs médicaux à usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque

Lit et literie

- Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
- Utiliser les sacs à linge usuels
- Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité

Environnement

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
- Entretien de l'environnement direct du patient 1x/j
- Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement

Déchets

- Elimination des déchets selon les filières habituelles

Déclaration du cas

Déclaration au médecin cantonal

Oui,

Utiliser le formulaire déclaration de résultats d'analyses cliniques pour le **Tétanos**, - Site OFSP

A renvoyer dans un délai d'une semaine au médecin cantonal