

Toxoplasmose



Mise à jour
18/11/2024

Informations relatives à
Hôpitaux FHV, Cliniques, CTR / Bloc opératoire

Epidémiologie

Agent infectieux

Toxoplasma gondii (protozoaire)

Réservoir

Le chat, hôte définitif, excrète des oocystes dans les selles. Ce parasite peut s'enkyster dans les tissus des oiseaux et des mammifères, dont l'homme

Mode de transmission



Dans la communauté:



Par ingestion d'oocystes présents dans les excréments de chat (carrés de sable, caisses à chat, terre).



Consommation de viande parasitée crue ou insuffisamment cuite (porc ou mouton, rarement boeuf)



Consommation d'aliments contaminés par des oocystes présents dans les excréments de chat.



A l'hôpital: lors de transplantation d'organes solides, rarement lors de transfusion sanguines d'un donneur infecté

Période d'incubation

De 5 à 23 jours

Durée d'infectiosité

Pas de transmission interhumaine, à l'exception de l'infection transplacentaire et des rares cas liés à des transfusions sanguines ou des transplantations d'organes

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

L'application des Précautions Standard est suffisante

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains

Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydro-alcoolique (PHA)

Gants



Non indiqués en systématique



A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

Blouse de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Masque de soins

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Lunettes de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Nettoyage et désinfection

Matériel de soins



Dispositifs médicaux a usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque



Vaisselle : filière habituelle

Lit et literie



Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre



Utiliser les sacs à linge usuels

Environnement

Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien

Déchets

Elimination des déchets selon les filières habituelles

Déclaration du cas

Déclaration au médecin cantonal



Chez un patient VIH positif sans diagnostic préalable de SIDA, une toxoplasmose cérébrale est un critère diagnostique de SIDA.



De ce fait, la déclaration médicale est obligatoire dans un délai de 1 semaine
