

Toxoplasmose



Mise à jour
18/11/2024

Informations relatives à
CHUV / Endoscopie

Epidémiologie

Agent infectieux

Toxoplasma gondii (protozoaire)

Réservoir

Le chat, hôte définitif, excrète des oocystes dans les selles. Ce parasite peut s'enkyster dans les tissus des oiseaux et des mammifères, dont l'homme

Mode de transmission



Dans la communauté:



Par ingestion d'oocystes présents dans les excréments de chat (carrés de sable, caisses à chat, terre).



Consommation de viande parasitée crue ou insuffisamment cuite (porc ou mouton, rarement boeuf)



Consommation d'aliments contaminés par des oocystes présents dans les excréments de chat.



A l'hôpital: lors de transplantation d'organes solides, rarement lors de transfusion sanguines d'un donneur infecté

Période d'incubation

De 5 à 23 jours

Durée d'infectiosité

Pas de transmission interhumaine, à l'exception de l'infection transplacentaire et des rares cas liés à des transfusions sanguines ou des transplantations d'organes

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles



Aucune, application des Précautions Standard

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains



Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique

Gants



Si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée

Blouse de protection



Si risque de projections de liquides biologiques

Masque de soins



Si risque de projections de liquides biologiques



Lors de symptômes respiratoires

Lunettes de protection



Si risque de projections de liquides biologiques

Nettoyage et désinfection

Matériel de soins

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel
 - Retraiter le matériel à usage multiple après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque
-

Lit et literie

- Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
 - Utiliser les sacs à linge usuels
 - Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité
-

Environnement

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
 - Entretien de l'environnement direct du patient 1x par jour
 - Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement
-

Déchets

- Elimination des déchets selon les filières habituelles
-

Déclaration du cas

Déclaration au médecin cantonal



Chez un patient VIH positif sans diagnostic préalable de SIDA, une toxoplasmose cérébrale est une maladie révélatrice de SIDA.



De ce fait, la déclaration médicale est obligatoire dans un délai de 1 semaine (formulaire Sida)
