HPCi | hygiène, prévention et contrôle de l'infection

Toxoplasmose

PS

Mise à jour
18/11/2024

Informations relatives à
CHUV / Stérilisation

Epidémiologie

Agent infectieux

- *Toxoplasma gondii* (protozoaire)

Réservoir

- Le chat, hôte définitif, excrète des oocytes dans les selles. Ce parasite peut s'enkyster dans les tissus des oiseaux et des mammifères, dont l'homme

Mode de transmission

- Dans la communauté:
  - Par ingestion d'oocystes présents dans les excréments de chat (carrés de sable, caisses à chat, terre).
  - Consommation de viande parasitée crue ou insuffisamment cuite (porc ou mouton, rarement boeuf)

- Consommation d'aliments contaminés par des oocystes présents dans les excréments de chat.
- A l'hôpital: lors de transplantation d'organes solides, rarement lors de transfusion sanguines d'un donneur infecté

Période d'incubation

- De 5 à 23 jours

Durée d'infectiosité

- Pas de transmission interhumaine, à l'exception de l'infection transplacentaire et des rares cas liés à des transfusions sanguines ou des transplantations d'organes

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

- Aucune, application des Précautions Standard

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains

- Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique

Gants

- Si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée

Blouse de protection

- Si risque de projections de liquides biologiques

Masque de soins

- Si risque de projections de liquides biologiques
- Lors de symptômes respiratoires

Lunettes de protection

- Si risque de projections de liquides biologiques

Nettoyage et désinfection

Matériel de soins

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel

- Retraiter le matériel à usage multiple après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque

Lit et literie

- Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
- Utiliser les sacs à linge usuels
- Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité

Environnement

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
- Entretien de l'environnement direct du patient 1x par jour
- Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement

Déchets

- Elimination des déchets selon les filières habituelles

Déclaration du cas

Déclaration au médecin cantonal

- Chez un patient VIH positif sans diagnostic préalable de SIDA, une toxoplasmose cérébrale est une maladie révélatrice de SIDA.

De ce fait, la déclaration médicale est obligatoire dans un délai de 1 semaine (formulaire Sida)