HPCi | hygiène, prévention et contrôle de l'infection

Trichinellose (Trichinose)

PS

Mise à jour
17/11/2026

Informations relatives à
Hôpitaux FHV, Cliniques, CTR / Endoscopie

Epidémiologie

Agent infectieux

- *Trichinella spiralis* (parasite nématode)

Réservoir

- Porcs, chevaux, chiens, chats et nombreux animaux sauvages (rats, renards etc.)

Mode de transmission

- Dans la communauté: avant tout, par la consommation de viande de porc crue ou insuffisamment cuite, par la charcuterie préparée à partir de ces viandes, plus rarement par consommation de viande de cheval ou de chasse

A l'hôpital: pas de transmission connue

Période d'incubation

Des signes intestinaux peuvent apparaître après 8 à 15 jours (extrêmes 5 à 45 jours)

Durée d'infectiosité

Pas de transmission interhumaine

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

L'application des Précautions Standard est suffisante

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains

Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydroalcoolique

Gants

- Non indiqué en systématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

Blouse de protection

- Non indiqué en systématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de projection de liquides biologiques)

Masque de soins

- Non indiqué en systématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de projection de liquides biologiques ou lors de symptômes respiratoires)

Lunettes de protection

- Non indiqué en sytématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de projection de liquides biologiques)

Nettoyage et désinfection

Matériel de soins

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel
- Dispositifs médicaux à usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque

Lit et literie

- Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
- Utiliser les sacs à linge usuels
- Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité

Environnement

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
- Entretien de l'environnement direct du patient 1x/j
- Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement

Déchets

- Elimination des déchets selon les filières habituelles

Déclaration du cas

Déclaration au médecin cantonal

Oui

Utiliser le formulaire de déclartion des résultats cliniques **Trichinellose** - Site OFSP

A envoyer au médecin cantonal dans un délai d'une semaine