HPCi | hygiène, prévention et contrôle de l'infection

# Infections urogénitales à Chlamydia trachomatis

PS

Mise à jour
30/10/2026

Autres dénominations
Chlamydia Trachomatis

Informations relatives à
CHUV / Toutes spécialités

## Epidémiologie

### Agent infectieux

*Chlamydia trachomatis*

### Réservoir

Homme

### Mode de transmission

Par rapports sexuels, lors de l'accouchement par voie basse transmission verticale mère-enfant

## Période d'incubation

Probablement 7 à 14 jours ou plus

## Durée d'infectiosité

Prolongée en l'absence de traitement

# Prise en charge du cas positif/suspect

## Précautions Standard + Mesures Additionnelles

Aucune, application des Précautions Standard

## Autre

Dépistage et traitement du(des) partenaire(s) sexuel(s)

# Mesures de protection/prévention pour le personnel

## Hygiène des mains

Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique

## Gants

- Si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée

## Blouse de protection

- Si risque de projections de liquides biologiques

## Masque de soins

- Si risque de projections de liquides biologiques
- Lors de symptômes respiratoires

## Lunettes de protection

- Si risque de projections de liquides biologiques

# Nettoyage et désinfection

## Matériel de soins

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel

- Retraiter le matériel à usage multipe après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque

## Lit et literie

- Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
- Utiliser les sacs à linge usuels
- Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité

## Environnement

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
- Entretien de l'environnement direct du patient 1x par jour
- Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement

## Déchets

- Elimination des déchets selon les filières habituelles