

Trichomonas vaginalis (Trichomoniose)



Mise à jour
18/11/2024

Informations relatives à
CMS et soignants indépendants

Epidémiologie

Agent infectieux

Trichomonas vaginalis (protozoaire)

Réservoir

Homme

Mode de transmission

Par contact avec des sécrétions vaginales ou urétrales de personnes infectées lors de contacts sexuels

Période d'incubation

4 à 20 jours, en moyenne 7 jours, souvent portage asymptomatique

Durée d'infectiosité

Pendant toute la durée de l'infection, qui peut persister des années en l'absence de traitement

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

L'application des Précautions Standard est suffisante

Prise en charge des personnes contacts

Mesures

Dépistage et traitement du(des) partenaire(s) sexuel(s)

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains

Gants



Non indiqués en systématique



A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

Blouse de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Masque de soins

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Lunettes de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Nettoyage et désinfection

Matériel de soins



Dispositifs médicaux a usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque



Vaisselle : filière habituelle

Lit et literie



Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre



Utiliser les sacs à linge usuels

Environnement

Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien

Déchets

Elimination des déchets selon les filières habituelles
