HPCi | hygiène, prévention et contrôle de l'infection

Trichomonas vaginalis (Trichomoniase)

Mise à jour
17/11/2026

Informations relatives à
CHUV / Toutes spécialités

Epidémiologie

Agent infectieux

- *Trichomonas vaginalis* (protozoaire)

Réservoir

- Homme

Mode de transmission

- Par contact avec des sécrétions vaginales ou urétrales de personnes infectées lors de contacts sexuels

Période d'incubation

4 à 28 jours, en moyenne 7 jours, souvent portage asymptomatique

Durée d'infectiosité

Pendant toute la durée de l'infection, qui peut persister des années en l'absence de traitement

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

Aucune, application des Précautions Standard

Prise en charge des personnes contacts

Mesures

Dépistage et traitement du(des) partenaire(s) sexuel(s)

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains

- Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique

Gants

- Si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée

Blouse de protection

- Si risque de projections de liquides biologiques

Masque de soins

- Si risque de projections de liquides biologiques
- Lors de symptômes respiratoires

Lunettes de protection

- Si risque de projections de liquides biologiques

Nettoyage et désinfection

Matériel de soins

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel
- Retraiter le matériel à usage multipe après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque

Lit et literie

- Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
- Utiliser les sacs à linge usuels
- Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité

Environnement

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
- Entretien de l'environnement direct du patient 1x par jour
- Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement

Déchets

- Elimination des déchets selon les filières habituelles