

# Varicelle



Mise à jour  
13/11/2024

Informations relatives à  
Cabinets et polycliniques / Dentaire

## Epidémiologie

## Agent infectieux

Virus varicella-zoster (VZV)

---

## Réservoir

Homme

---

## Mode de transmission



En l'absence d'immunité pour VZV, probabilité de transmission très élevée (>85%).



Transmission:



Par fines gouttelettes < 5 microns (aérosol), dont la production est exacerbée par la toux, la conversation ou l'éternuement. Elles peuvent rester en suspension dans l'air quelques heures et être transportées à

distance. D'autres personnes peuvent donc s'infecter sans qu'il y ait une proximité immédiate avec le patient source

-  Par contact direct entre patients
  -  Par l'intermédiaire du personnel (mains)
  -  Par contact indirect (matériel de soins ou d'examens, instruments, environnement immédiat)
- 

## Période d'incubation

-  Extrêmes : 10 à 21 jours
  -  Médiane : 14 à 16 jours
  -  En cas d'administration d'immunoglobulines spécifiques, la durée de l'incubation peut être prolongée d'une semaine
- 

## Durée d'infectiosité

De 1 à 2 jours avant l'apparition du rash jusqu'à ce que toutes les lésions soient croûteuses (5 jours ou plus si persistance de lésions actives)

---

## Prise en charge du cas positif/suspect

### Placement

-  Mise à l'écart dans l'attente de la consultation
  -  Éviter la salle d'attente
  -  Faire porter un masque de soins au patient
-

## Durée des mesures

Jusqu'à l'absence de nouvelles vésicules (minimum 5 jours, voire plus en cas d'immunosuppression)

---

## Transport

-  Faire porter un masque de soins au patient
  -  Lors d'un transfert en cabinet médical ou à l'hôpital. pour mis en place des mesures adéquates, Avertir:
    -  le transporteur
    -  le service de destination
- 

## Autre

-  Veiller particulièrement à ce que les patients atteints de varicelle n'entrent pas en contact avec les patients immunocompromis
  -  La varicelle chez la femme enceinte, les parturientes et leur nouveau-né nécessite des mesures particulières
  -  Une enquête d'entourage doit être effectuée pour déterminer l'indication à des mesures prophylactiques, si les mesures d'isolement n'ont pas été appliquées
  -  Paramètres épidémiologiques propres à la Suisse:
    -  probabilité qu'un sujet >10 ans soit immun: 94%, valeur prédictive positive d'une anamnèse positive (prise entre 9 et 18 ans): 98%, valeur prédictive négative d'une anamnèse négative (prise entre 9 et 18 ans): 26%.
-

## Mesures en cas d'épidémie

-  Cohorte possible lors d'épidémie
-  Se référer aux recommandations de l'unité HPCi

---

## Mesures de protection/prévention pour le personnel

### Hygiène des mains

Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydro-alcoolique (PHA)

---

### Gants

-  Non indiqués en systématique
  -  A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)
- 

### Masque de soins

-  Le port du masque FFP2 est requis dans tous les cas.
  -  Cependant, pour le personnel immunisé contre la varicelle, le risque de contamination est réduit.
-

## Lunettes de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Mesures complémentaires

-  Le personnel sans antécédent documenté de varicelle ni vaccination ne devrait pas être assigné aux soins de patients atteints de varicelle afin de limiter le risque de contamination personnelle ainsi que la transmission de nouvelles infections.
-  Si la prise en charge de ces patients par un membre non immunisé est inévitable, le port d'un masque FFP2 est indispensable.
-  En cas d'exposition à la varicelle, le personnel non immun doit immédiatement consulter le service de médecine du personnel ou, à défaut, l'unité cantonale HPCI ou l'infectiologue de garde.
-  Une vaccination est recommandée pour le personnel non immunisé.

---

## Nettoyage/désinfection

### Matériel de soins

-  Réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles
  -  Dispositifs médicaux à usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque
  -  Privilégier le matériel à usage unique
- 

## Environnement

Après la consultation



aérer le local (ouvrir la fenêtre et garder la porte fermée) la salle de consultation (examen) durant 1 heure avant la consultation suivante

---

## Déchets

Elimination des déchets selon les filières habituelles

---