

# Angine à streptocoque du groupe A



Mise à jour  
09/10/2024

Informations relatives à  
Hôpitaux FHV, Cliniques, CTR / Psychiatrie

## Epidémiologie

## Agent infectieux

*Streptococcus pyogenes* du groupe A

---

## Réservoir

Homme

---

## Mode de transmission



par des particules de grosse dimension (> 5 microns) dont la production est exacerbée par la toux, la conversation, les interventions telles que bronchoscopie, etc. Ce type de transmission se limite à un rayon de 1 à 2 mètres depuis la source



les mains ou les gants contaminés par les gouttelettes peuvent aussi être un vecteur (gouttelettes > mains > yeux ou bouche)



portes d'entrée: muqueuses (bouche, nez, gorge) d'une autre personne.

---

## Période d'incubation

1 à 3 jours, rarement plus

---

## Durée d'infectiosité

Jusqu'à 24 heures après le début du traitement

---

## Prise en charge du cas positif/suspect

### Précautions Standard + Mesures Additionnelles



Aucune, application des Précautions Standard



Mesures Additionnelles GOUTTELETES si nourrisson ou jeune enfant

---

## Placement

### **Si Mesures Additionnelles Gouttelettes :**



Chambre individuelle ou isolement géographique



Cohortage possible (regroupement de plusieurs patients avec le même germe)

---

## Durée des mesures

### Si Mesures Additionnelles Gouttelettes :

-  Jusqu'à 24h après le début du traitement
- 

## Suivi microbiologique

-  Pas de prélèvement de suivi en fin de traitement, sauf avis contraire infectiologue ou HPCi
- 

## Matériel de soins

-  Le matériel de soins est réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles
  -  Privilégier le matériel à usage unique
- 

## Transport

### Si Mesures Additionnelles Gouttelettes :

-  Masque de soins pour le patient et le transporteur
-  Toilette corporelle du jour réalisée, chemise d'hôpital propre, protections changées si incontinence, pansements hermétiques et non souillés si plaies, désinfection des mains
-  Si transfert en chaise, y suspendre la plaquette de la potence du lit
-  Désinfection du pourtour du lit et des accessoires (pompes à perfusion, chaise roulante) avant de sortir de la chambre
-  Surblouse et gants pas nécessaires pour le patient et le transporteur

 Limiter les déplacements aux besoins essentiels

**Si Mesures Additionnelles Gouttelettes :**

-  Port d'un masque de soins par le patient et le transporteur
  -  Vêtements propres
  -  Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates
  -  Limiter les déplacements pendant la durée de la maladie
- 

## Circulation

**Si Mesures Additionnelles Gouttelettes :**

-  Sorties limitées à la physiothérapie de mobilisation et aux besoins essentiels.  
Lors d'hospitalisation prolongée et si patient compliant, possibilité de sorties au BH 08 ou à l'extérieur
  -  Masque de soins pour le patient et le soignant
  -  Surblouse et gants pas nécessaires pour le patient
  -  Surblouse indiquée pour le soignant seulement si contact direct avec le patient
- 

## Transfert/Sortie

**Si Mesures Additionnelles Gouttelettes :**

-  Avertir le service/l'établissement de soins de destination
- 

## Mesures en cas d'épidémie

-  Cohortage possible lors d'épidémie



Se référer aux recommandations de l'unité HPCi-CHUV

---

## Mesures de protection/prévention pour le personnel

### Hygiène des mains



Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique

---

### Gants



Non indiqués en systématique



A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

---

### Blouse de protection



Si risque de projections de liquides biologiques



Ou si Mesures Additionnelles Gouttelettes

---

### Masque de soins



A porter selon les indications des Précautions Standard (risque de projections de liquides biologiques ou lors de symptômes respiratoires)



Ou si Mesures Additionnelles Gouttelettes

---

## Nettoyage/désinfection

### Matériel de soins



Utiliser le détergent/désinfectant usuel



Retraiter le matériel à usage multiple après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque

---

### Lit et literie



Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre



Utiliser les sacs à linge usuels



Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité

---

### Environnement



Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien



Entretien de l'environnement direct du patient 1x par jour



Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement

---

### Déchets



Elimination des déchets selon les filières habituelles

---