

# Angine à streptocoque du groupe A



Mise à jour  
09/10/2024

Informations relatives à  
Cabinets et polycliniques / Dialyse ambulatoire

## Epidémiologie

## Agent infectieux

*Streptococcus pyogenes* du groupe A

---

## Réservoir

Homme

---

## Mode de transmission



par des particules de grosse dimension (> 5 microns) dont la production est exacerbée par la toux, la conversation, les interventions telles que bronchoscopie, etc. Ce type de transmission se limite à un rayon de 1 à 2 mètres depuis la source



les mains ou les gants contaminés par les gouttelettes peuvent aussi être un vecteur (gouttelettes > mains > yeux ou bouche)



portes d'entrée: muqueuses (bouche, nez, gorge) d'une autre personne.

---

## Période d'incubation

1 à 3 jours, rarement plus

---

## Durée d'infectiosité

Jusqu'à 24 heures après le début du traitement

---

## Prise en charge du cas positif/suspect

### Précautions Standard + Mesures Additionnelles

Chez l'adulte : aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante

Chez le jeune enfant et le nourrisson: GOUTTELETTES

---

## Durée des mesures

Jusqu'à 24 heures après le début d'un traitement antibiotique adéquat

---

## Matériel de soins

Privilégier le matériel à usage unique

---

## Circulation

Limiter les déplacements durant les 24 heures après début du traitement antibiotique

### Si Mesures Additionnelles Gouttelettes :

-  Limiter les déplacements durant les Mesures Additionnelles Gouttelettes
- 

## Visiteurs

### Si Mesures Additionnelles Gouttelettes :

-  Port d'un masque de soins
  -  Ne pas s'asseoir sur le lit
  -  Désinfection des mains en sortant de la chambre
  -  Surblouse seulement si participation aux soins
- 

## Mesures de protection/prévention pour le personnel

### Hygiène des mains

Hygiène des mains selon les 5 indications de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique

---

### Gants

Non indiqués en systématique

A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

---

## Blouse de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Masque de soins

Chez l'enfant, port d'un masque de soins par le personnel lorsque le travail s'effectue dans un rayon de 1 à 2 mètres de l'enfant

---

## Lunettes de protection



Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Nettoyage/désinfection

### Matériel de soins



Dispositifs médicaux à usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque



Vaisselle : filière habituelle

---

# Déchets

Elimination des déchets selon les filières habituelles

---