

# Angine à streptocoque du groupe A



Mise à jour  
09/10/2024

Informations relatives à  
CHUV / Pédiatrie

## Epidémiologie

### Agent infectieux

*Streptococcus pyogenes* du groupe A

---

### Réservoir

Homme

---

## Mode de transmission

- par des particules de grosse dimension (> 5 microns) dont la production est exacerbée par la toux, la conversation, les interventions telles que bronchoscopie, etc. Ce type de transmission se limite à un rayon de 1 à 2 mètres depuis la source
- les mains ou les gants contaminés par les gouttelettes peuvent aussi être un vecteur (gouttelettes > mains > yeux ou bouche)

- portes d'entrée: muqueuses (bouche, nez, gorge) d'une autre personne.
- 

## Période d'incubation

1 à 3 jours, rarement plus

---

## Durée d'infectiosité

Jusqu'à 24 heures après le début du traitement

## Prise en charge du cas positif/suspect

### Précautions Standard + Mesures Additionnelles

- Aucune, application des Précautions Standard
  - Mesures Additionnelles GOUTTELETTES si nourrisson ou jeune enfant
- 

## Placement

### Si Mesures Additionnelles Gouttelettes :

- Chambre individuelle ou isolement géographique
  - Cohortage possible (regroupement de plusieurs patients avec le même germe)
-

# Durée des mesures

## Si Mesures Additionnelles Gouttelettes :

- Jusqu'à 24h après le début du traitement
- 

# Signalétique

## Si Mesures Additionnelles Gouttelettes :

- Affiche A3 pour les visiteurs et affiche "entrée Mesures Additionnelles" sur la porte à l'extérieur de la chambre
  - Chariot d'isolement avec surblouses + masques de soins devant la chambre
  - Affiche "sortie Mesures Additionnelles" sur la porte à l'intérieur de la chambre
  - Plaquette sur la potence du lit, à transférer sur la chaise lors de transport
  - Aux soins intensifs/continus, si pas de box disponible, délimiter avec du ruban adhésif rouge le périmètre d'isolement
  - Avant intervention chirurgicale, indiquer les Mesures Additionnelles dans Digistat
- 

# Suivi microbiologique

- Pas de prélèvement de suivi en fin de traitement, sauf avis contraire infectiologue ou HPCI
- 

# Matériel de soins

- Le matériel de soins est réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles



Privilégier le matériel à usage unique

---

## Transport

### **Si Mesures Additionnelles Gouttelettes :**

- Masque de soins pour le patient et le transporteur
  - Toilette corporelle du jour réalisée, chemise d'hôpital propre, protections changées si incontinence, pansements hermétiques et non souillés si plaies, désinfection des mains
  - Si transfert en chaise, y suspendre la plaquette de la potence du lit
  - Désinfection du pourtour du lit et des accessoires (pompes à perfusion, chaise roulante) avant de sortir de la chambre
  - Surblouse et gants pas nécessaires pour le patient et le transporteur
  - Limiter les déplacements aux besoins essentiels
- 

## Circulation

### **Si Mesures Additionnelles Gouttelettes**

- Sorties limitées à la physiothérapie de mobilisation et aux besoins essentiels.  
Lors d'hospitalisation prolongée et si patient compliant, possibilité de sorties au BH 08 ou à l'extérieur
- Toilette corporelle du jour réalisée, chemise d'hôpital propre, protections changées si incontinence, pansements hermétiques et non souillés si plaies, désinfection des mains
- Le fauteuil du patient ou tout autre dispositif est désinfecté au moyen d'une lingette imprégnée d'alcool ou de détergent/désinfectant avant la sortie de la chambre
- Masque de soins pour le patient et le soignant
- Surblouse et gants pas nécessaires pour le patient

-  Surblouse indiquée pour le soignant seulement si contact direct avec le patient
- 

## Visiteurs

### Si Mesures Additionnelles Gouttelettes :

-  Port d'un masque de soins
  -  Ne pas s'asseoir sur le lit
  -  Désinfection des mains en sortant de la chambre
  -  Surblouse seulement si participation aux soins
- 

## Transfert/Sortie

### Si Mesures Additionnelles Gouttelettes :

-  Avertir le service/l'établissement de soins de destination
- 

## Mesures en cas d'épidémie

-  Cohortage possible lors d'épidémie
-  Se réréfer aux recommandations de l'unité HPCi-CHUV

## Mesures de protection/prévention pour le personnel

## Hygiène des mains

- Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique
- 

## Gants

- Non indiqués en systématique
  - A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)
- 

## Blouse de protection

- Si risque de projections de liquides biologiques
  - Ou si Mesures Additionnelles Gouttelettes
- 

## Masque de soins

- A porter selon les indications des Précautions Standard (risque de projections de liquides biologiques ou lors de symptômes respiratoires)
  - Ou si Mesures Additionnelles Gouttelettes
-

## Lunettes de protection

- Non en systématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (risque d'exposition à des liquides biologiques)

---

## Nettoyage/désinfection

### Matériel de soins

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel
  - Retraiter le matériel à usage multiple après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque
- 

### Lit et literie

- Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
  - Utiliser les sacs à linge usuels
  - Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité
- 

### Environnement

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
- Entretien de l'environnement direct du patient 1x par jour

-  Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement
- 

## Déchets

-  Elimination des déchets selon les filières habituelles
-