

Acinetobacter du groupe baumannii multirésistant aux soins intensifs - CHUV



Mise à jour
12/12/2016

Informations relatives à
CHUV / Endoscopie

Epidémiologie

Agent infectieux

- *Acinetobacter* du groupe *baumannii* (*A. baumannii*, *A. nosocomialis*, *A. pittii* - multirésistant)
- *Acinetobacter* spp est une bactérie opportuniste. La majorité des épidémies ont été rapportées aux soins intensifs, en particulier dans des unités de grands brûlés

Réservoir

- environnement (sol, eau, aliments). *Acinetobacter* spp peut survivre plusieurs jours sur des surfaces inertes
 - peut faire partie de la flore résidente cutanée, des voies respiratoires supérieures ou des voies génitales
-

Mode de transmission

-  par contact direct entre patients
 -  par l'intermédiaire du personnel (mains)
 -  par contact indirect (matériel de soins ou d'examens, instruments, environnement immédiat)
-

Période d'incubation

-  Variable
-

Durée d'infectiosité

-  Aussi longtemps qu'une personne est infectée ou colonisée par le germe. Aux soins intensifs le patient est considéré comme colonisé pendant tout le séjour. *Acinetobacter spp* peut survivre plusieurs jours dans l'environnement

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

-  Mesures Additionnelles Contact
 -  Mesures Additionnelles Gouttelettes si infection respiratoire
-

Placement

-  Chambre individuelle
 -  Cohortage possible (regroupement de plusieurs patients avec le même germe/même type de résistance)
-

Durée des mesures

-  Pendant toute la durée du séjour aux soins intensifs
-

Signalétique

-  Affiche A3 pour les visiteurs et affiche "entrée Mesures Additionnelles" sur la porte à l'extérieur de la chambre
 -  Chariot d'isolement avec surblouses (+ masques de soins si Mesures Additionnelles Gouttelettes) devant la chambre
 -  Affiche "sortie Mesures Additionnelles" sur la porte à l'intérieur de la chambre
 -  Plaquette sur la potence du lit, à transférer sur la chaise lors de transport
 -  Aux soins intensifs/continus, si pas de box disponible, délimiter avec du ruban adhésif rouge le périmètre d'isolement
 -  Avant intervention chirurgicale, indiquer les Mesures Additionnelles dans Digistat
-

Soins de base



Toilette corporelle quotidienne avec des lingettes à la chlorhexidine

Matériel de soins



Le matériel de soins est réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles



Privilégier le matériel à usage unique

Transport



Si Mesures Additionnelles Gouttelettes : masque de soins pour le patient et le transporteur



Toilette corporelle du jour réalisée, chemise d'hôpital propre, protections changées si incontinence, pansements hermétiques et non souillés si plaies, désinfection des mains



Si transfert en chaise, y suspendre la plaquette de la potence du lit



Surblouse et gants pas nécessaires pour le patient et le transporteur



Limitier les déplacements aux besoins essentiels

Circulation



Sorties limitées à la physiothérapie de mobilisation et aux besoins essentiels. Lors d'hospitalisation prolongée et si patient compliant, possibilité de sorties au BH 08 ou à l'extérieur



Toilette corporelle du jour réalisée, chemise d'hôpital propre, protections changées si incontinence, pansements hermétiques et non souillés si plaies, désinfection des mains



Le fauteuil du patient ou tout autre dispositif est désinfecté au moyen d'une lingette imprégnée d'alcool ou de détergent/désinfectant avant la sortie de la

chambre



Si Mesures Additionnelles Gouttelettes : masque de soins pour le patient et le soignant



Surblouse et gants pas nécessaires pour le patient



Surblouse indiquée pour le soignant seulement si contact direct avec le patient

Visiteur



Ne pas s'asseoir sur le lit



Désinfection des mains en sortant de la chambre



Surblouse seulement si participation aux soins



Si Mesures Additionnelles Gouttelettes : masque de soins

Transfert/Sortie



Avertir le service/l'établissement de soins de destination

Autre



Patient brûlé: port de la tenue spéciale pantalon + casaque bleus + sabots pour le personnel, suivre les recommandations spécifiques disponibles sur le site intranet du SMIA (Soins/techniques de soins/Hygiène hospitalière)



Patient non brûlé: port de la tenue habituelle pantalon + polo blancs pour le personnel, suivre les recommandations spécifiques disponibles sur le site intranet du SMIA (Soins/techniques de soins/Hygiène hospitalière)

Mesures en cas d'épidémie

- > Cohortage possible lors d'épidémie
 - > Se référer aux recommandations de l'unité HPCi-CHUV
-

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains

- > Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique
-

Gants

- > Non indiqués en systématique
 - > A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)
-

Blouse de protection

- > Oui, si contact direct avec le patient ou son environnement immédiat
 - > Pas nécessaire si simple passage dans la chambre
-

Masque

-  Non, sauf si Mesures Additionnelles Gouttelettes
 -  Ou selon les indications des Précautions Standard (risque de projections de liquides biologiques ou lors de symptômes respiratoires)
-

Lunettes de protection

-  Non en systématique
 -  A porter selon les indications des Précautions Standard (risque de projections de liquides biologiques)
-

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins

-  Utiliser le détergent/désinfectant usuel
-  Le matériel à usage multiple doit être désinfecté 2x
 -  1x dans le box
 -  1x à l'extérieur du box
-  Suivre les recommandations spécifiques disponibles sur le site intranet du SMIA (Voir doc sous : Soins/techniques de soins/Hygiène hospitalière)

A la levée des Mesures Additionnelles :

-  Désinfecter tout le matériel à usage multiple présent en chambre
-  Le matériel à usage multiple doit être désinfecté 2x
 -  1x dans le box
 -  1x à l'extérieur du box
-  Suivre les recommandations spécifiques disponibles sur le site intranet du SMIA (Voir doc sous : Soins/techniques de soins/Hygiène hospitalière)

-  Eliminer le matériel non désinfectable (boîtes de gants, masques, lingettes, etc) présent en chambre/box
-

Lit et literie

-  Utiliser les sacs à linge usuels
-  Se désinfecter les mains avant toute manipulation de linge propre
-  Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité

A la levée des Mesures Additionnelles :

-  Changer le lit et la literie
-

Environnement

-  Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
-  Entretien de l'environnement direct du patient 1x par jour
-  Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement
-  Suivre les recommandations spécifiques disponibles sur le site intranet du SMIA (Voir doc sous : Soins/techniques de soins/Hygiène hospitalière)

Au départ du patient :

-  Désinfection minutieuse de l'environnement direct du patient (table de nuit, armoire patient, etc.)
 -  Nettoyage et désinfection de la chambre par le service propreté et hygiène
 -  Changement du rideau de lit ou nettoyage de la surface du paravent
 -  Suivre les recommandations spécifiques disponibles sur le site intranet du SMIA (Voir doc sous : Soins/techniques de soins/Hygiène hospitalière)
-

Déchets



Elimination des déchets selon les filières habituelles
