

Bactéries productrices de carbapénémase

Mise à jour
29/09/2026Autres dénominations
Carbapénémase
EPC
CREInformations relatives à
Ambulances et transporteurs

Epidémiologie

Agent infectieux

Entérobactéries, *Pseudomonas* ou *Acinetobacter* producteurs de carbapénémase

Réservoir



Homme

Mode de transmission



Par contact direct entre patients



Par l'intermédiaire du personnel (mains)

 Par contact indirect avec des objets contaminés (dispositifs médicaux et environnement direct du patient)

Période d'incubation

 Variable

Durée d'infectiosité

 Durée du portage de la bactérie productrice de carbapénémase, de quelques semaines à plusieurs mois. Peut être prolongée en particulier chez les patients immunocompromis

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante

Matériel de soins

-  Le matériel de soins est réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles
 -  Privilégier le matériel à usage unique (UU)
 -  Prévoir un stock de matériel à UU pour 24h uniquement
-

Transport

Lors d'un transfert en cabinet médical ou à l'hôpital, avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains



Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydroalcoolique

Gants



Non indiqués en systématique



A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

Blouse de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques.

Masque de soins

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Lunettes de protection

- > Non, à porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de projections de liquides biologiques)

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins

- > Dispositifs médicaux à usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque
- > Vaisselle : filière habituelle

Environnement

- > Lors de la levée des mesures ou au départ du patient :
 - > Tout le matériel non-désinfectable présent en chambre est jeté
 - > Tout le matériel désinfectable présent en chambre est à désinfecter
 - > Les rideaux ou parois de séparation sont changés ou désinfectés respectivement

Déclaration du cas

Déclaration au médecin cantonal

- > Déclaration du médecin dans un délai d'une semaine

Autre information

À consulter



Dépliant d'information pour les patients porteurs de microorganismes multirésistants
