

# Bactéries productrices de carbapénémase

Mise à jour  
29/09/2026Autres dénominations  
Carbapénémase  
EPC  
CREInformations relatives à  
Cabinets et polycliniques / Dialyse ambulatoire

## Epidémiologie

### Agent infectieux

Entérobactéries, *Pseudomonas* ou *Acinetobacter* producteurs de carbapénémase

### Réservoir



Homme

### Mode de transmission



Par contact direct entre patients



Par l'intermédiaire du personnel (mains)

 Par contact indirect avec des objets contaminés (dispositifs médicaux et environnement direct du patient)

---

## Période d'incubation

 Variable

---

## Durée d'infectiosité

 Durée du portage de la bactérie productrice de carbapénémase, de quelques semaines à plusieurs mois. Peut être prolongée en particulier chez les patients immunocompromis

---

## Prise en charge du cas positif/suspect

### Précautions Standard + Mesures Additionnelles

Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante

---

## Matériel de soins

-  Le matériel de soins est réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles
  -  Privilégier le matériel à usage unique (UU)
  -  Prévoir un stock de matériel à UU pour 24h uniquement
-

## Transport

Lors d'un transfert en cabinet médical ou à l'hôpital, avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates

---

## Visiteurs

Ne pas s'asseoir sur le lit  
Désinfection des mains en entrant et en sortant de la chambre  
Surblouse seulement si participation aux soins  
Limiter le nombre de visiteurs

---

## Mesures de protection/prévention pour le personnel

### Hygiène des mains



Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydroalcoolique

---

### Gants



Non indiqués en systématique



A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

---

### Blouse de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques.

---

## Masque de soins

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Lunettes de protection

- > Non, à porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de projections de liquides biologiques)

---

## Nettoyage/désinfection

### Matériel de soins

- > Dispositifs médicaux à usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque
  - > Vaisselle : filière habituelle
- 

## Environnement

- > Lors de la levée des mesures ou au départ du patient :
    - > Tout le matériel non-désinfectable présent en chambre est jeté
    - > Tout le matériel désinfectable présent en chambre est à désinfecter
    - > Les rideaux ou parois de séparation sont changés ou désinfectés respectivement
-

# Déchets

Elimination des déchets selon les filières habituelles

---

## Déclaration du cas

## Déclaration au médecin cantonal



Déclaration du médecin dans un délai d'une semaine

---