

Contact VRE / ERV / ERG (Entérocoque résistant à la vancomycine)



Mise à jour
16/10/2026

Informations relatives à
EMS, EPSM, ESE, CAT

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

L'application des Précautions Standard est suffisante

Placement

Maintien en chambre si résident avec incontinence fécale ou non observant des mesures d'hygiène jusqu'à réception du dépistage

Durée des mesures

 Le suivi des cas contacts est effectué durant une période d'un an après le dernier contact à risque.

Suivi microbiologique

- > Admission d'un résident ayant eu un contact avec un résident porteur de EPC (CRE), en accord avec l'unité cantonale HPCI
 - > Contrôle de la colonisation (portage) par un frottis rectal (avec matière fécale visible) réalisé à J0, un second frottis rectal à J7, et une culture de selles effectuée à J14.
-

Matériel de soins

- > si Mesures Additionnelles:
 - > Le matériel de soins est réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles
 - > Désinfection rigoureuse du matériel à usage multiple (stéthoscope, brassard à pressions, glucomètre, saturomètre, etc)
 - > Privilégier le matériel à usage unique (UU)
 - > Prévoir un stock de matériel à UU pour 24h uniquement
-

Transport

En cas d'hospitalisation, avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates

Mesures en cas d'épidémie

- > Cohortage possible lors d'épidémie



Se référer aux recommandations de l'équipe HPCI

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains



Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydroalcoolique

Gants



Non indiqué en systématique



A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

Blouse de protection



Oui,



lors des soins au résident/client si infection active



si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques

Masque de soins



Non indiqué en systématique



A porter selon les indications des Précautions Standard (risque de projection de liquides biologiques ou lors de symptômes respiratoires)

Lunettes de protection



Non indiqué en systématique



A porter selon les indications des Précautions Standard (risque de projections de liquides biologiques)

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins



Dispositifs médicaux a usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque



Vaisselle : filière habituelle

Lit et literie



Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre



Utiliser les sacs à linge usuels



Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité

Environnement



Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien

Déchets



Élimination des déchets selon les filières habituelles
