HPCi | hygiène, prévention et contrôle de l'infection

# Contact VRE / ERV / ERG (Entérocoque résistant à la vancomycine)

C PS

Mise à jour
16/10/2026

Informations relatives à
Hôpitaux FHV, Cliniques, CTR / Soins intensifs

## Prise en charge du cas positif/suspect

### Précautions Standard + Mesures Additionnelles

- Mesures Additionnelles Contact Préemptive si le dernier contact remonte < 3 mois
- Précautions Standard si le dernier contact remonte > 3 mois

---

## Placement

**Si Mesures Additionnelles Contact :**

- Chambre individuelle
- Cohortage possible avec un autre contact VRE du même cas index (chambre à 2 lits max)

---

## Durée des mesures

- Le suivi des cas contacts est effectué durant une période d'un an après le dernier contact à risque.

## Signalétique

**Si Mesures Additionnelles Contact :**

- Affiche sur la porte à l'extérieur de la chambre (entrée) et intérieur (sortie)
- Surblouses devant la chambre ou dans le SAS
- Aux soins intensifs/continus, si pas de box disponible, délimiter le périmètre d'isolement géographique
- Avant intervention chirurgicale :  communiquer au bloc opératoire les Mesures Additionnelles

## Suivi microbiologique

- **Si dernier contact  < 3 mois** : faire 3 frottis rectaux à 1 semaine d'intervalle minimum (j0, j7 et j14) à partir de la dernière exposition
- **Si dernier contact > 3 mois** : faire 3 frottis rectaux successifs. Après chaque prélèvement, attendre le résultat (PCR) avant de réaliser le suivant. Si le résultat est négatif, procéder au prélèvement suivant jusqu'à l'obtention de 3 prélèvements négatifs (PCR)
- Frottis avec matière fécale visible

## Matériel de soins

- Le matériel de soins est réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles
- Privilégier le matériel à usage unique (UU)
- Ne pas stocker du matériel à usage unique en chambre, sauf si nécessaire et max pour 24h

# Transport

**Si Mesures Additionnelles Contact :**

- Toilette corporelle du jour réalisée, chemise d'hôpital propre, protection changée si incontinence, pansements hermétiques et non souillés, désinfection des mains
- Désinfection du pourtour du lit et des accessoires avant de sortir de la chambre
- Avertir le service de destination et le transporteur pour qu'il prenne les mesures adéquates
- Limiter les déplacements aux besoins essentiels

---

# Circulation

**SA**

**Si Mesures Additionnelles Contact :**

- En principe pas de sortie de la chambre
- Si sortie jugée nécessaire par le médecin en charge et en accord avec le service HPCI (pour rééducation, long séjour, etc) :
  - Toilette corporelle du jour réalisée, chemise d'hôpital propre, protection changée si incontinence, pansements hermétiques et non souillés, désinfection des mains
  - Fauteuil du patient ou autre dispositif désinfectés avant la sortie de la chambre et de débuter une activité
  - Surblouse et gants pas nécessaire pour le patient
  - Surblouse indiquée pour le soignant seulement si contact direct avec le patient

**CTR**

- En absence d'infection,  le patient peut circuler librement :
  - Toilette du jour effectuée
  - Vêtements propres
  - Pansements hermétiques et non souillés

- Désinfection des mains avant de sortir de la chambre

## Visiteurs

**Si Mesures Additionnelles Contact :**

- Ne pas s'asseoir sur le lit
- Désinfection des mains en entrant et en sortant de la chambre
- Surblouse si participation aux soins

## Transfert/sortie

- Avertir le service/l'établissement de soins de destination

## Mesures en cas d'épidémie

- Cohortage possible lors d'épidémie
- Se référer aux recommandations de l'équipe HPCI

# Mesures de protection/prévention pour le personnel

## Hygiène des mains

- Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydroalcoolique

## Gants

- Non indiqué en systématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

## Blouse de protection

- Si risque de projections de liquides biologiques
- Ou si Mesures Additionnelles Contact (sauf si simple passage dans la chambre)

## Masque de soins

- Non indiqué en systématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (risque de projection de liquides biologiques ou lors de symptômes respiratoires)

## Lunettes de protection

- Non indiqué en sytématique

- A porter selon les indications des Précautions Standard (risque de projections de liquides biologiques)

# Nettoyage/désinfection

## Matériel de soins

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel
- Retraiter le matériel à usage multiple après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque

## Lit et literie

- Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
- Utiliser les sacs à linge usuels
- Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité

## Environnement

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel
- Entretien de l'environnement direct du patient 1x/j
- Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement

## Déchets

Élimination des déchets selon les filières habituelles