HPCi | hygiène, prévention et contrôle de l'infection

Contact VRE / ERV / ERG (Entérocoque résistant à la vancomycine)

PS

Mise à jour
16/10/2026

Informations relatives à
Hôpitaux FHV, Cliniques, CTR / Psychiatrie

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

- Aucune, application des Précautions Standard

Placement

- En chambre individuelle si la date du dernier contact remonte à moins de 3 mois
- Cohortage possible avec un autre contact VRE du même cas index (chambre à 2 lits maximum)

Durée des mesures

- 3 premiers mois à partir de la dernière exposition avec un patient positif

- Se référer au message algerme

Suivi microbiologique

- Frottis rectal à J0, J7 et J14 (+/-2 jours) du dernier contact à risque
- Si > J14, le délai entre les prélèvements peut être raccourci (attendre le résultat du prélèvement et si PCR négative effectuer le suivant)

Transfert/sortie

- Avertir le service/l'établissement de soins de destination

Mesures en cas d'épidémie

- Cohortage possible lors d'épidémie
- Se référer aux recommandations de l'unité HPCi-CHUV

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains

- Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique

Gants

- Si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée

Blouse de protection

- Si risque de projections de liquides biologiques

Masque de soins

- Si risque de projections de liquides biologiques
- Lors de symptômes respiratoires

Lunettes de protection

- Si risque de projections de liquides biologiques

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel

- Retraiter le matériel à usage multipe après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque

Lit et literie

- Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
- Utiliser les sacs à linge usuels
- Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité

Environnement

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
- Entretien de l'environnement direct du patient 1x par jour
- Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement

Déchets

- Elimination des déchets selon les filières habituelles