

Contact VRE / ERV / ERG (Entérocoque résistant à la vancomycine)



Mise à jour
07/11/2024

Informations relatives à
CHUV / Bloc opératoire

Résolu

Epidémie de VRE en cours à l'Hôpital de Morges (EHC), CTR d'Aubonne et de Gilly

Déclenchée le 17/01/2025

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

- Mesures Additionnelles Contact Préemptive (jusqu'à exclusion du portage de VRE) si la date du dernier contact remonte à moins de 3 mois
- Précautions Standard si le dernier contact remonte à plus de 3 mois
- Se référer au message Algerme

Placement

Si Mesures Additionnelles Contact :

- Chambre individuelle
 - Cohortage possible avec un autre contact VRE du même cas index (chambre à 2 lits maximum)
-

Durée des mesures

- 3 premiers mois à partir de la dernière exposition avec un patient positif
 - Se référer au message algerme
-

Signalétique

- Affiche A3 pour les visiteurs et affiche "entrée Mesures Additionnelles" sur la porte à l'extérieur de la chambre
 - Chariot d'isolement avec surblouses devant la chambre
 - Affiche "sortie Mesures Additionnelles" sur la porte à l'intérieur de la chambre
 - Plaquette sur la potence du lit, à transférer sur la chaise lors de transport
 - Aux soins intensifs/continus, si pas de box disponible, délimiter avec du ruban adhésif rouge le périmètre d'isolement
 - Avant intervention chirurgicale, indiquer les Mesures Additionnelles dans Digistat
-

Suivi microbiologique

- Frottis rectal à J0, J7 et J14 (+/-2 jours) du dernier contact à risque

- Si > J14, le délai entre les prélèvements peut être raccourci (attendre le résultat du prélèvement et si PCR négative effectuer le suivant)
-

Soins de base

- Toilette corporelle quotidienne avec du savon simple
-

Matériel de soins

- Le matériel de soins est réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles
 - Privilégier le matériel à usage unique
-

Transport

Si Mesures Additionnelles :

- Toilette corporelle du jour réalisée, chemise d'hôpital propre, protections changées si incontinence, pansements hermétiques et non souillés, désinfection des mains
 - Surblouse et gants pas nécessaires pour le patient et le transporteur
 - Si transfert en chaise, y suspendre la plaquette de la potence du lit
 - Désinfection du pourtour du lit et des accessoires (pompes à perfusion, chaise roulante) avant de sortir de la chambre
 - Limiter les déplacements aux besoins essentiels
-

Circulation

Si Mesures Additionnelles Contact :

Sorties hors de la chambre :

- Sorties limitées à la physiothérapie de mobilisation et aux besoins essentiels.
Lors d'hospitalisation prolongée et si patient compliant, possibilité de sorties au BH 08 ou à l'extérieur
- Toilette corporelle du jour réalisée, chemise d'hôpital propre, protections changées si incontinence, pansements hermétiques et non souillés si plaies, désinfection des mains
- Le fauteuil du patient ou tout autre dispositif est désinfecté au moyen d'une lingette imprégnée d'alcool ou de détergent/désinfectant avant la sortie de la chambre
- Surblouse et gants pas nécessaires pour le patient
- Surblouse indiquée pour le soignant seulement si contact direct avec le patient

Pour CUTR Sylvana :

- Sortie de chambre autorisée en absence de diarrhées ou d'incontinence fécale non contenue pour physiothérapie, ergothérapie, rééducation, repas en salle commune, en accord avec l'unité HPCi-CHUV :
 - Habits propres
 - Mains désinfectées

Visiteurs

Si Mesures Additionnelles Contact :

- Ne pas s'asseoir sur le lit
 - Désinfection des mains en sortant de la chambre
 - Surblouse seulement si participation aux soins
-

Transfert/sortie

- Avertir le service/l'établissement de soins de destination
-

Mesures en cas d'épidémie

- Cohortage possible lors d'épidémie
- Se référer aux recommandations de l'unité HPCI-CHUV

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains

- Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique
-

Gants

- Non indiqués en systématique
 - A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)
-

Blouse de protection

- Si risque de projections de liquides biologiques
 - Ou si Mesures Additionnelles Contact (sauf si simple passage dans la chambre)
-

Masque de soins

- Non en systématique
 - A porter selon les indications des Précautions Standard (risque de projection de liquides biologiques ou lors de symptômes respiratoires)
-

Lunettes de protection

- Non en systématique
 - A porter selon les indications des Précautions Standard (risque de projections de liquides biologiques)
-

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel
 - Retraiter le matériel à usage multiple après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque
-

Lit et literie

- Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
 - Utiliser les sacs à linge usuels
 - Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité
-

Environnement

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
 - Entretien de l'environnement direct du patient 1x par jour
 - Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement
-

Déchets

- Elimination des déchets selon les filières habituelles
-