

Contact carbapénémase / EPC / CPE / CRE (entérobactérie productrice / résistante de carbapénémase)



Mise à jour
07/11/2024

Informations relatives à
EMS, EPSM, ESE, CAT

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

L'application des Précautions Standard est suffisante

Placement

Maintien en chambre si résident avec incontinence fécale ou non observant des mesures d'hygiène jusqu'à réception du dépistage

Durée des mesures

Suivi microbiologique

-  Admission d'un résident ayant eu un contact avec un résident porteur de EPC (CRE),
 -  en accord avec l'unité cantonale HPCI, contrôle de la colonisation (portage) à une semaine d'intervalle par:
 -  un frottis rectal (avec matière fécale visible) (J0 et J7)
 -  et culture de selles (J14)
-

Matériel de soins

Utiliser le détergent/désinfectant usuel

Transport

En cas d'hospitalisation, avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates

Mesures en cas d'épidémie

-  Cohorte possible lors d'épidémie



Se référer aux recommandations de l'unité HPCi

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains

Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydro-alcoolique (PHA)

Gants



Non indiqués en systématique



A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

Blouse de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Masque de soins

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Lunettes de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins

-  Dispositifs médicaux à usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque
 -  Vaisselle : filière habituelle
 -  Privilégier le matériel à usage unique
-

Lit et literie

-  Utiliser les sacs à linge usuels
 -  A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient, désinfecter le lit et changer la literie
-

Environnement

-  Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien de l'environnement direct et des sanitaires
 -  Utiliser le détergent usuel pour les sols
-

Déchets

Élimination selon les filières habituelles
