

# Contact carbapénémase / EPC / CPE / CRE



Mise à jour  
16/10/2026

Informations relatives à  
Hôpitaux FHV, Cliniques, CTR / Endoscopie

## Prise en charge du cas positif/suspect

### Précautions Standard + Mesures Additionnelles



Mesures Additionnelles Contact Préemptive si le dernier contact remonte < 3 mois



Précautions Standard si le dernier contact remonte > 3 mois

---

## Placement

### Si Mesures Additionnelles Contact :



Chambre individuelle



Cohortage possible avec un autre contact Carbapénémase du même cas index (chambre à 2 lits max)

---

## Durée des mesures

- > Le suivi des cas contacts est effectué durant une période d'un an après le dernier contact à risque.
- 

## Signalétique

### Si Mesures Additionnelles Contact :

- > Affiche sur la porte à l'extérieur de la chambre (entrée) et intérieur (sortie)
  - > Surblouses devant la chambre ou dans le SAS
  - > Aux soins intensifs/continus, si pas de box disponible, délimiter le périmètre d'isolement géographique
  - > Avant intervention chirurgicale : communiquer au bloc opératoire les Mesures Additionnelles
- 

## Suivi microbiologique

- > **Si dernier contact < 3 mois** : faire 3 frottis rectaux à 1 semaine d'intervalle minimum (j0, j7 et j14) à partir de la dernière exposition
  - > **Si dernier contact > 3 mois** : faire 3 frottis rectaux successifs. Après chaque prélèvement, attendre le résultat (PCR) avant de réaliser le suivant. Si le résultat est négatif, procéder au prélèvement suivant jusqu'à l'obtention de 3 prélèvements négatifs (PCR)
  - > Frottis avec matière fécale visible
- 

## Matériel de soins

- > Le matériel de soins est réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles
  - > Privilégier le matériel à usage unique (UU)
  - > Ne pas stocker du matériel à usage unique en chambre, sauf si nécessaire et max pour 24h
-

# Transport

## Si Mesures Additionnelles Contact :

- > Toilette corporelle du jour réalisée, chemise d'hôpital propre, protection changée si incontinence, pansements hermétiques et non souillés, désinfection des mains
  - > Désinfection du pourtour du lit et des accessoires avant de sortir de la chambre
  - > Avertir le service de destination et le transporteur pour qu'il prenne les mesures adéquates
  - > Limiter les déplacements aux besoins essentiels
- 

# Circulation

## SA

## Si Mesures Additionnelles Contact :

- > En principe pas de sortie de la chambre
- > Si sortie jugée nécessaire par le médecin en charge et en accord avec le service HPCI (pour rééducation, long séjour, etc) :
  - > Toilette corporelle du jour réalisée, chemise d'hôpital propre, protection changée si incontinence, pansements hermétiques et non souillés, désinfection des mains
  - > Fauteuil du patient ou autre dispositif désinfectés avant la sortie de la chambre et de débiter une activité
  - > Surblouse et gants pas nécessaire pour le patient
  - > Surblouse indiquée pour le soignant seulement si contact direct avec le patient

## CTR

- > En absence de facteurs de risque (infection, diarrhées ou incontinence fécale non contenue), le patient peut circuler librement :
  - > Toilette du jour effectuée
  - > Vêtements propres
  - > Pansements hermétiques et non souillés



Désinfection des mains avant de sortir de la chambre

---

## Visiteurs

### Si Mesures Additionnelles Contact :



Ne pas s'asseoir sur le lit



Désinfection des mains en entrant et en sortant de la chambre



Surblouse si participation aux soins

---

## Transfert/sortie



Avertir le service/l'établissement de soins de destination

---

## Mesures en cas d'épidémie



Cohortage possible lors d'épidémie



se référer aux recommandations de l'équipe HPCI

---

## Mesures de protection/prévention pour le personnel

### Hygiène des mains



Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydroalcoolique

---

## Gants



Non indiqué en systématique



A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

---

## Blouse de protection



SI risque de projections de liquides biologiques



Ou si Mesures Additionnelles Contact (sauf si simple passage dans la chambre)

---

## Masque de soins



Non indiqué en systématique



A porter selon les indications des Précautions Standard (risque de projection de liquides biologiques ou lors de symptômes respiratoires)

---

## Lunettes de protection



Non indiqué en systématique

- > A porter selon les indications des Précautions Standard (risque de projections de liquides biologiques)

---

## Nettoyage/désinfection

### Matériel de soins

- > Utiliser le détergent/désinfectant usuel
- > Retraiter le matériel à usage multiple après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque

---

### Lit et literie

- > Utiliser les sacs à linge usuels
- > A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient, désinfecter le lit et changer la literie
- > Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
- > Utiliser les sacs à linge usuels
- > Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité

---

### Environnement

- > Utiliser le détergent/désinfectant usuel
  - > Entretien de l'environnement direct du patient 1x/j
  - > Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement
-

# Déchets



Élimination des déchets selon les filières habituelles

---