

Contact carbapénémase / EPC / CPE / CRE (entérobactérie productrice / résistante de carbapénémase)



Mise à jour
07/11/2024

Informations relatives à
CHUV / Bloc opératoire

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

-  Mesures Additionnelles Contact Préemptive (jusqu'à exclusion du portage de Carbapénémase) si la date du dernier contact remonte à moins de 3 mois
-  Précautions Standard si le dernier contact remonte à plus de 3 mois
-  Se référer au message Algerme

Placement

Si Mesures Additionnelles Contact :

-  Chambre individuelle



Cohortage possible avec un autre contact Carbapénémase du même cas index (chambre à 2 lits maximum)

Durée des mesures



3 premiers mois à partir de la dernière exposition avec un patient positif



Se référer au message algerme

Signalétique



Affiche A3 pour les visiteurs et affiche "entrée Mesures Additionnelles" sur la porte à l'extérieur de la chambre



Chariot d'isolement avec surblouses devant la chambre



Affiche "sortie Mesures Additionnelles" sur la porte à l'intérieur de la chambre



Plaquette sur la potence du lit, à transférer sur la chaise lors de transport



Aux soins intensifs/continus, si pas de box disponible, délimiter avec du ruban adhésif rouge le périmètre d'isolement



Avant intervention chirurgicale, indiquer les Mesures Additionnelles dans Digistat

Suivi microbiologique



Frottis rectal à J0, J7 et J14 (+ ou - 2 jours) du dernier contact à risque



Si > J14, le délai entre les prélèvements peut être raccourci (attendre le résultat du prélèvement et si PCR négative effectuer le suivant)

Soins de base

- > Toilette corporelle quotidienne avec du savon simple
-

Matériel de soins

- > Le matériel de soins est réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles
 - > Privilégier le matériel à usage unique
-

Transport

Si Mesures Additionnelles :

- > Toilette corporelle du jour réalisée, chemise d'hôpital propre, protections changées si incontinence, pansements hermétiques et non souillés, désinfection des mains
 - > Surblouse et gants pas nécessaires pour le patient et le transporteur
 - > Si transfert en chaise, y suspendre la plaque de la potence du lit
 - > Désinfection du pourtour du lit et des accessoires (pompes à perfusion, chaise roulante) avant de sortir de la chambre
 - > Limiter les déplacements aux besoins essentiels
-

Circulation

Si Mesures Additionnelles Contact :

- > Sorties limitées à la physiothérapie de mobilisation et aux besoins essentiels. Lors d'hospitalisation prolongée et si patient compliant, possibilité de sorties au

BH 08 ou à l'extérieur

-  Toilette corporelle du jour réalisée, chemise d'hôpital propre, protections changées si incontinence, pansements hermétiques et non souillés si plaies, désinfection des mains
-  Le fauteuil du patient ou tout autre dispositif est désinfecté au moyen d'une lingette imprégnée d'alcool ou de détergent/désinfectant avant la sortie de la chambre
-  Surblouse et gants pas nécessaires pour le patient
-  Surblouse indiquée pour le soignant seulement si contact direct avec le patient

Pour CUTR Sylvana :

-  Sortie de chambre autorisée en absence de diarrhées ou d'incontinence fécale non contenue pour physiothérapie, ergothérapie, rééducation, repas en salle commune, en accord avec l'unité HPCi-CHUV :
 -  Habits propres
 -  Mains désinfectées

Visiteurs

Si Mesures Additionnelles Contact :

-  Ne pas s'asseoir sur le lit
-  Désinfection des mains en sortant de la chambre
-  Surblouse seulement si participation aux soins

Transfert/sortie

-  Avertir le service/l'établissement de soins de destination
-

Mesures en cas d'épidémie

- > Cohortage possible lors d'épidémie
- > Se référer aux recommandations de l'unité HPCi-CHUV

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains

- > Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique

Gants

- > Non indiqués en systématique
- > A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

Blouse de protection

- > Si risque de projections de liquides biologiques
 - > Ou si Mesures Additionnelles Contact (sauf si simple passage dans la chambre)
-

Masque de soins



Non en systématique



A porter selon les indications des Précautions Standard (risque de projection de liquides biologiques ou lors de symptômes respiratoires)

Lunettes de protection



Non en systématique



A porter selon les indications des Précautions Standard (risque de projections de liquides biologiques)

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins



Utiliser le détergent/désinfectant usuel



Retraiter le matériel à usage multiple après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque

Lit et literie



Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre



Utiliser les sacs à linge usuels



Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité

Environnement

-  Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
 -  Entretien de l'environnement direct du patient 1x par jour
 -  Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement
-

Déchets

-  Elimination des déchets selon les filières habituelles
-