

# Contact carbapénémase / EPC / CPE / CRE (entérobactérie productrice / résistante de carbapénémase)



Mise à jour  
07/11/2024

Informations relatives à  
CHUV / Psychiatrie

## Prise en charge du cas positif/suspect

### Précautions Standard + Mesures Additionnelles

- Aucune, application des Précautions Standard
- 

### Placement

- En chambre individuelle si la date du dernier contact remonte à moins de 3 mois
  - Cohortage possible avec un autre contact Carbapénémase du même cas index (chambre à 2 lits maximum)
-

## Durée des mesures

- 3 premiers mois à partir de la dernière exposition avec un patient positif
  - Se référer au message algerme
- 

## Suivi microbiologique

- Frottis rectal à J0, J7 et J14 (+ ou - 2 jours) du dernier contact à risque
  - Si > J14, le délai entre les prélèvements peut être raccourci (attendre le résultat du prélèvement et si PCR négative effectuer le suivant)
- 

## Transfert/sortie

- Avertir le service/l'établissement de soins de destination
- 

## Mesures en cas d'épidémie

- Cohortage possible lors d'épidémie
- Se référer aux recommandations de l'unité HPCi-CHUV

## Mesures de protection/prévention pour le personnel

## Hygiène des mains

- Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique
- 

## Gants

- Si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée
- 

## Blouse de protection

- Si risque de projections de liquides biologiques
- 

## Masque de soins

- Si risque de projections de liquides biologiques
  - Lors de symptômes respiratoires
- 

## Lunettes de protection

- Si risque de projections de liquides biologiques

---

## Nettoyage/désinfection

### Matériel de soins

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel
  - Retraiter le matériel à usage multiple après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque
- 

### Lit et literie

- Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
  - Utiliser les sacs à linge usuels
  - Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité
- 

### Environnement

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
  - Entretien de l'environnement direct du patient 1x par jour
  - Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement
- 

### Déchets



Elimination des déchets selon les filières habituelles

---