

Syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV)



Mise à jour
18/11/2024

Autres dénominations

MERS-CoV

Coronavirus MERS

Informations relatives à
CHUV / Dialyse

Epidémiologie

Agent infectieux

MERS coronavirus

Réservoir

Camélidés (dromadaires, chameaux)

Mode de transmission

Par contact étroit et possiblement par voie respiratoire

Période d'incubation

2 à 14 jours, en moyenne 5 jours

Durée d'infectiosité

Jusqu'à guérison

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

Voir procédure spécifique Coronavirus MERS-CoV

Hospitalisation :

-  Mesures Additionnelles Aérosol + Mesures Additionnelles Contact
-  Voir fiche ci-dessous

Ambulatoire interventionnel :

-  Mesures Additionnelles Aérosol + Mesures Additionnelles Contact
-  Voir tableau synthétique [secteurs ambulatoires interventionnels](#)

Ambulatoire non interventionnel :

-  Mesures Additionnelles Aérosol + Mesures Additionnelles Contact
 -  Voir tableau synthétique [secteurs ambulatoires non interventionnels](#)
-

Placement

-  Chambre individuelle, avec SAS

- Cohortage possible (regroupement de plusieurs patients avec le même germe)

Pour CUTR Sylvana et la psychiatrie :

- Transfert dans un service de soins somatique
-

Durée des mesures

- Selon indications de l'infectiologue et du service HPCi-CHUV
-

Signalétique

- Affiche A3 pour les visiteurs et affiche "entrée Mesures Additionnelles" sur la porte à l'extérieur de la chambre
 - Chariot d'isolement avec masques FFP2 devant la chambre
 - Affiche "sortie Mesures Additionnelles" sur la porte à l'intérieur de la chambre
 - Plaquette sur la potence du lit, à transférer sur la chaise lors de transport
 - Aux soins intensifs/continus, si pas de box disponible, délimiter avec du ruban adhésif rouge le périmètre d'isolement
 - Avant intervention chirurgicale, indiquer les Mesures Additionnelles dans Digistat
-

Soins de base

- Pas d'utilisation de douche commune durant les Mesures Additionnelles
-

Matériel de soins

- > Le matériel de soins est réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles
 - > Privilégier le matériel à usage unique
-

Transport

- > Port du masque de soins pour le patient et masque FFP2 pour le transporteur
 - > Toilette corporelle du jour réalisée, chemise d'hôpital propre, protections changées si incontinence, pansements hermétiques et non souillés si plaies, désinfection des mains
 - > Si transfert en chaise, y suspendre la plaquette de la potence du lit
 - > Surblouse et gants pas nécessaires pour le patient et le transporteur
 - > Limiter les déplacements aux besoins essentiels
-

Circulation

- > Pas de sortie, sauf exception à discuter avec l'équipe HPCi-CHUV
-

Visiteurs

- > Voir procédure spécifique Coronavirus MERS-CoV
-

Transfert/sortie



Avertir le service/l'établissement de soins de destination

Autre

[Voir procédure spécifique Coronavirus MERS-CoV](#)

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains



[Voir procédure spécifique Coronavirus MERS-CoV](#)

Gants



[Voir procédure spécifique Coronavirus MERS-CoV](#)

Blouse de protection



[Voir procédure spécifique Coronavirus MERS-CoV](#)

Masque de soins



Voir procédure spécifique Coronavirus MERS-CoV

Lunettes de protection



Voir procédure spécifique Coronavirus MERS-CoV

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins



Utiliser le détergent/désinfectant usuel

A la levée des Mesures Additionnelles :



Si le patient est toujours contagieux à son départ, attendre au moins 1 heure avant le début des nettoyages (durée minimum nécessaire à l'évacuation des aérosols contagieux)



Pour CUTR Sylvana et la psychiatrie : aérer la chambre (ouvrir la fenêtre et fermer la porte) au minimum 1h ou plus si pas d'aération possible (4h à 6h)



Désinfecter tout le matériel à usage multiple présent en chambre



Éliminer le matériel non désinfectable (boîtes de gants, masques, lingettes, etc) présent dans la zone patient (< 2 m)



Conserver le matériel non désinfectable (boîtes de gants, masques, lingettes, etc) présent hors de la zone patient (> 2 m) sauf si souillures visibles

Lit et literie



Utiliser les sacs à linge usuels

-  Se désinfecter les mains avant toute manipulation de linge propre
-  Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité

A la levée des Mesures Additionnelles :

-  Si le patient est toujours contagieux à son départ , attendre au moins 1 heure avant le début des nettoyages (durée minimum nécessaire à l'évacuation des aérosols contagieux)
 -  Pour CUTR Sylvana et la psychiatrie : aérer la chambre (ouvrir la fenêtre et fermer la porte) au minimum 1h ou plus si pas d'aération possible (4h à 6h)
 -  Changer le lit et la literie
-

Environnement

-  Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
-  Entretien de l'environnement direct du patient 1x par jour
-  Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement

A la levée des Mesures Additionnelles :

-  Si le patient est toujours contagieux à son départ , attendre au moins 1 heure avant le début des nettoyages (durée minimum nécessaire à l'évacuation des aérosols contagieux)
 -  Pour CUTR Sylvana et la psychiatrie : aérer la chambre (ouvrir la fenêtre et fermer la porte) au minimum 1h ou plus si pas d'aération possible (4h à 6h)
 -  Désinfection minutieuse de l'environnement direct du patient (table de nuit, armoire patient, etc.)
 -  Nettoyage et désinfection de la chambre par le service propreté et hygiène
 -  Changement du rideau de lit ou nettoyage de la surface du paravent
 -  Trempage du rideau de la salle de bains
-

Déchets



Elimination des déchets selon les filières habituelles

Déclaration du cas

Déclaration au service HPCI



Oui, dans l'heure

Déclaration au médecin cantonal



Déclaration du médecin par téléphone dans l'heure
