

Pseudomonas aeruginosa multirésistant

Mise à jour
16/10/2026

Informations relatives à
Cabinets et polycliniques / Dentaire

Epidémiologie

Agent infectieux

- > *Pseudomonas aeruginosa* multirésistant: souche résistante à au moins un antibiotique dans au moins 3 classes d'antibiotiques habituellement efficaces (aminosides, carbapénèmes, céphalosporines anti-*Pseudomonas*, fluoroquinolones anti-*Pseudomonas*, piperacilline/tazobactam, aztreonam, fosfomycine, colistine)
-

Réservoir

- > Environnement (sol, eau), à l'hôpital en particulier les siphons des lavabos et réservoirs d'eau
-

Mode de transmission

- > Par contact direct entre patients
- > Par l'intermédiaire du personnel (mains)

- > Par contact indirect avec des objets contaminés (dispositifs médicaux et environnement direct du patient)
-

Période d'incubation

- > Variable
-

Durée d'infectiosité

- > Aussi longtemps qu'une personne est infectée par le *Pseudomonas aeruginosa* multiresistant
-

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains

- > Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydroalcoolique
-

Gants

- > Non indiqué en systématique
 - > A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)
-

Lunettes de protection

-  Non indiqué en systématique
 -  A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de projections de liquides biologiques)
-