

Pseudomonas aeruginosa multirésistant

Mise à jour
16/10/2026

Informations relatives à
Cabinets et polycliniques / Dialyse ambulatoire

Epidémiologie

Agent infectieux

- > *Pseudomonas aeruginosa* multirésistant: souche résistante à au moins un antibiotique dans au moins 3 classes d'antibiotiques habituellement efficaces (aminosides, carbapénèmes, céphalosporines anti-*Pseudomonas*, fluoroquinolones anti-*Pseudomonas*, piperacilline/tazobactam, aztreonam, fosfomycine, colistine)
-

Réservoir

- > Environnement (sol, eau), à l'hôpital en particulier les siphons des lavabos et réservoirs d'eau
-

Mode de transmission

- > Par contact direct entre patients
- > Par l'intermédiaire du personnel (mains)

 Par contact indirect avec des objets contaminés (dispositifs médicaux et environnement direct du patient)

Période d'incubation

 Variable

Durée d'infectiosité

 Aussi longtemps qu'une personne est infectée par le *Pseudomonas aeruginosa* multiresistant

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains

 Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydroalcoolique

Gants

 Non indiqué en systématique

 A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

Lunettes de protection

-  Non indiqué en systématique
 -  A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de projections de liquides biologiques)
-