

Entérite à parasites - Protozoaires intestinaux (sauf amibes)



Mise à jour
08/07/2024

Autres dénominations
Cryptosporidium
Cyclospora
Giardia Lamblia
Isospora
Microsporidiose

Informations relatives à
Hôpitaux FHV, Cliniques, CTR / Toutes spécialités

Epidémiologie

Agent infectieux

Protozoaires intestinaux: *Giardia lamblia*, *Cryptosporidium parvum et hominis*,
Cyclospora cayetanensis, *Isospora belli*, microsporidiose

Réservoir

Homme, animaux, aliments

Mode de transmission

Par ingestion de nourriture et eau contaminées

Période d'incubation

Variable selon le parasite

Durée d'infectiosité

Variable

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

L'application des Précautions Standard est suffisante

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains

Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique

Gants



Non indiqués en systématique



A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

Blouse de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Masque de soins

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Lunettes de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Déclaration du cas

Déclaration au service HPCI

Non
