

# Entérite à parasites - Protozoaires intestinaux (sauf amibes)



Mise à jour  
08/07/2024

Autres dénominations  
Cryptosporidium  
Cyclospora  
Giardia Lamblia  
Isospora  
Microsporidiose

Informations relatives à  
Hôpitaux FHV, Cliniques, CTR / Endoscopie

## Epidémiologie

## Agent infectieux

Protozoaires intestinaux: *Giardia lamblia*, *Cryptosporidium parvum et hominis*,  
*Cyclospora cayetanensis*, *Isospora belli*, microsporidiose

---

## Réservoir

Homme, animaux, aliments

---

## Mode de transmission

Par ingestion de nourriture et eau contaminées

---

## Période d'incubation

Variable selon le parasite

---

## Durée d'infectiosité

Variable

---

## Prise en charge du cas positif/suspect

### Précautions Standard + Mesures Additionnelles

L'application des Précautions Standard est suffisante

---

## Mesures de protection/prévention pour le personnel

### Hygiène des mains

Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique

---

## Gants



Non indiqués en systématique



A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

---

## Blouse de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Masque de soins

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Lunettes de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Déclaration du cas

## Déclaration au service HPCI

Non

---

