

Candida auris



Mise à jour
06/11/2024

Informations relatives à
Hôpitaux FHV, Cliniques, CTR / Psychiatrie

Epidémiologie

Agent infectieux



Candida auris (levure non-filamenteuse multi-résistante aux antifongiques)

Réservoir

Humains (peau, muqueuses, tube digestif, voies urinaires, voies respiratoires).

Environnement

Mode de transmission

-  Par contact direct, par exemple par des mains ou des gants contaminés, entre patients
 -  Par contact indirect, par exemple par le biais d'objets contaminés (par exemple, brassard de tensiomètre, thermomètre) et de surfaces (par exemple, tables de chevet, barres de lit)
-

Période d'incubation

Variable

Durée d'infectiosité

Durée du portage (très variable:de quelques semaines à plusieurs mois)

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles



Mesures Additionnelles Contact

Placement



Chambre individuelle





Cohortage possible (regroupement de plusieurs patients avec le même germe/même type de résistance)

Durée des mesures




Pendant toute la durée du portage du Candida Auris (selon indication de l'unité HPCi-CHUV)



Suivi microbiologique

-  Réadmission d'un patient connu : prélèvement de suivi par frottis des aisselles et des plis de l'aîne si dernier résultat > 30 jours
 -  Si 1er prélèvement de suivi négatif et dernier prélèvement positif > 6 mois, faire un 2ème puis un 3ème prélèvement de suivi à 7 jours d'intervalle
-




Soins de base

-  En cas de douche commune, le patient en Mesures Additionnelles passe en dernier
-

Matériel de soins

-  Le matériel de soins est réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles
 -  Privilégier le matériel à usage unique
-

Transport

-  Vêtements propres
 -  Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates
 -  Limiter les déplacements pendant la durée de la maladie
-

Circulation

- Sortie de la chambre autorisée dans l'unité
 - habits propres, mains désinfectées
 - Repas en chambre
 - Maintien en chambre si infection
-

Visiteurs

- Ne pas s'asseoir sur le lit
 - Désinfection des mains en sortant de la chambre
 - Surblouse seulement si participation aux soins
-

Transfert/sortie

- Avertir le service/l'établissement de soins de destination
-

Autre

- Si nouveau cas : distribuer la brochure d'information au patient
-

Mesures en cas d'épidémie

- > Cohortage possible lors d'épidémie
- > Se référer aux recommandations de l'unité HPCi-CHUV
- > Cohortage possible lors d'épidémie
- > Se référer aux recommandations de l'unité HPCi

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains

- > Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique
- Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydro-alcoolique (PHA)



Gants

- > Non indiqués en systématique
- > A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)



Blouse de protection

- > Oui, si contact direct avec le patient ou son environnement immédiat
 - > Pas nécessaire si simple passage dans la chambre)
-

Masque de soins




-  Non en systématique
 -  A porter selon les indications des Précautions Standard (risque de projection de liquides biologiques ou lors de symptômes respiratoires)
-

Lunettes de protection




-  Non en systématique
 -  A porter selon les indications des Précautions Standard (risque de projections de liquides biologiques)
-

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins

-  Utiliser le détergent/désinfectant usuel
- A la levée des Mesures Additionnelles :**
-  Désinfecter tout le matériel à usage multiple présent en chambre
 -  Eliminer le matériel non désinfectable (boîtes de gants, masques, lingettes, etc) présent en chambre
-

Lit et literie

-  Utiliser les sacs à linge usuels
-  Se désinfecter les mains avant toute manipulation de linge propre
-  Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité

A la levée des Mesures Additionnelles :



Changer le lit et la literie

Déchets



Elimination des déchets selon les filières habituelles

Autre information

À consulter

<https://www.hpci.ch/prevention/fiches-techniques/contenu/nettoyage-et-d%C3%A9infection-de-l%E2%80%99environnement-direct-du-0>

Déclaration du cas

Déclaration au médecin cantonal



Oui, dès le premier cas
