

Candida auris

Mise à jour
21/10/2026Autres dénominations
Candidozyma AurisInformations relatives à
Cabinets et polycliniques / Médical

Epidémiologie

Agent infectieux

*Candida auris* (levure non-filamenteuse multi-résistante aux antifongiques)

Réservoir



Humains (peau, muqueuses, tube digestif, voies urinaires, voies respiratoires)



Environnement

Mode de transmission



Par contact direct entre patients



Par l'intermédiaire du personnel (mains)

 Par contact indirect avec des objets contaminés (dispositifs médicaux et environnement direct du patient)

Période d'incubation

 Variable

Durée d'infectiosité

 Durée du portage (très variable : de quelques semaines à plusieurs mois)

Prise en charge du cas positif/suspect

Transfert/sortie

Avertir le service/établissement de destination avant le transfert pour qu'il prenne les mesures adéquates (séjour en chambre individuelle)

et avertir le service HPCI

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains

 Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydroalcoolique

Gants



Non indiqué en systématique



A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

Masque de soins



Non indiqué en systématique



A porter selon les indications des Précautions Standard (risque de projection de liquides biologiques ou lors de symptômes respiratoires)

Lunettes de protection



Non indiqué en systématique



A porter selon les indications des Précautions Standard (risque de projection de liquides biologiques)

Déclaration du cas

Déclaration au médecin cantonal



Oui, utiliser le formulaire : **résultat exceptionnel d'analyses épidémiologiques en milieu hospitalier** - Site OFSP



A envoyer dans un délai de 24h au médecin cantonal



En cas de flambée de cas : utiliser le formulaire : **flambée exceptionnelle en milieu hospitalier** - Site OFSP



A envoyer dans un délai de 24h au médecin cantonal
