

Mucoviscidose avec colonisation/infection respiratoire par *Burkholderia* *cepacia* et/ou *Mycobacterium* *abscessus*

Mise à jour
13/11/2024

Autres dénominations
Burkholderia Cepacia
Mycobacterium Abscessus

Informations relatives à
Cabinets et polycliniques / Dentaire

Epidémiologie

Agent infectieux

- Cette fiche se concentre sur 2 complexes de germes particuliers :
 - *B.cepacia* complex incluant: *Burkholderia cepacia*, *B. multivorans*, *B. cenocepacia*
 - Germe associé à des résistances antibiotiques multiples
 - *Mycobacterium abscessus* :
 - Principale mycobactérie à croissance rapide pathogène chez l'homme
 - Entre 3-10% des patients souffrant de mucoviscidose en Europe et aux USA sont infectés par *M.abscessus*.
- Ces germes sont responsables notamment d'infections pulmonaires chroniques, particulièrement chez les patients avec pneumopathie sous-jacente (mucoviscidose, bronchiectasies)

Réservoir

-  Environnement (sol, eau) : survit dans des milieux humides
 -  Peut faire partie de la flore résidente des voies respiratoires supérieures (ex : mucoviscidose, bronchiectasies)
-

Mode de transmission

-  Par contact direct entre patients (très faible risque pour *M.abscessus*)
 -  Par l'intermédiaire du personnel (mains)
 -  Par contact indirect (matériel de soins ou d'examens, instruments, environnement immédiat) par l'environnement
-

Période d'incubation

Variable

Durée d'infectiosité

Aussi longtemps qu'une personne est infectée ou colonisée par le germe
