HPCi | hygiène, prévention et contrôle de l'infection

Papillomavirus humain

PS

Mise à jour
13/11/2024

Autres dénominations
HPV

Informations relatives à
Hôpitaux FHV, Cliniques, CTR / Stérilisation

Epidémiologie

Agent infectieux

- Virus du papillome humain (plusieurs dizaines de génotypes)

Réservoir

- Homme

Mode de transmission

- Par contact direct
- Par l'intermédiaire d'objets, de dispositifs médicaux contaminés
- Transmission verticale lors de l'accouchement

- Potentiellement par des fumées induites par des dispositifs d’électrocautérisation, bistouri à ultrasons, laser, etc.

Période d'incubation

- 2 à 3 mois

Durée d'infectiosité

- Aussi longtemps que l'infection est présente

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

L'application des Précautions Standard est suffisante pour les soins usuels

Autre

- En cas de procédure générant des fumées chirurgicales (par exemple, lors du traitement laser de condylomes), il est recommandé de:
  - travailler dans une salle dotée d’une ventilation mécanique adéquate
  - et utiliser un système d’aspiration des fumées situé au plus près de la source, avec un dispositif de captage adapté.
- Le port d’un masque FFP2 est nécessaire en l’absence d’aspiration efficace et de ventilation suffisante, bien qu’il ne protège pas contre les gaz et vapeurs contenus dans les fumées chirurgicales.

- Pour plus d’informations, veuillez consulter le document de la SUVA. « Factsheet Fumées chirurgicales – Risques et mesures de protection »

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains

- Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydroalcoolique

Gants

- Non indiqué en systématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

Blouse de protection

- Non indiqué en systématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de projection de liquides biologiques)

Masque de soins

- Non, sauf:
  - Projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques,

- Procédure de type chirurgical entraîne la génération de fumées : utiliser un masque ultrafiltrant de type FFP2

Lunettes de protection

- Non indiqué en sytématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de projection de liquides biologiques)

Nettoyage et désinfection

Matériel de soins

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel
- Dispositifs médicaux à usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque

Lit et literie

- Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
- Utiliser les sacs à linge usuels
- Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité

Environnement

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien

- Entretien de l'environnement direct du patient 1x/j
- Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement

Déchets

- Elimination des déchets selon les filières habituelles