

Papillomavirus humain

Mise à jour
13/11/2024Autres dénominations
HPV

Informations relatives à
Cabinets et polycliniques / Dialyse ambulatoire

Epidémiologie

Agent infectieux

Virus du papillome humain (plusieurs dizaines de génotypes)

Réservoir

Homme

Mode de transmission



Par contact direct



Par l'intermédiaire d'objets, de dispositifs médicaux contaminés



Transmission verticale lors de l'accouchement



Potentiellement par des fumées induites par des dispositifs d'électrocautérisation, bistouri à ultrasons, laser, etc.

Période d'incubation

2 à 3 mois

Durée d'infectiosité

Aussi longtemps que l'infection est présente

Prise en charge du cas positif/suspect

Autre



En cas de procédure générant des fumées chirurgicales (par exemple, lors du traitement laser de condylomes), il est recommandé de:



travailler dans une salle dotée d'une ventilation mécanique adéquate



et utiliser un système d'aspiration des fumées situé au plus près de la source, avec un dispositif de captage adapté.



Le port d'un masque FFP2 est nécessaire en l'absence d'aspiration efficace et de ventilation suffisante, bien qu'il ne protège pas contre les gaz et vapeurs contenus dans les fumées chirurgicales.



Pour plus d'informations, veuillez consulter le document de la SUVA. « [Factsheet Fumées chirurgicales – Risques et mesures de protection](#) »

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains

Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydro-alcoolique (PHA)

Gants

- > Non indiqués en systématique
 - > A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)
-

Blouse de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Masque de soins

- > Non, sauf:
 - > Projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques,
 - > Procédure de type chirurgical entraîne la génération de fumées : utiliser un masque ultrafiltrant de type FFP2
-

Lunettes de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Nettoyage et désinfection

Matériel de soins

-  Dispositifs médicaux a usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque
 -  Vaisselle : filière habituelle
-

Lit et literie

-  Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
 -  Utiliser les sacs à linge usuels
-

Environnement

Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien

Déchets

Elimination des déchets selon les filières habituelles
