

Papillomavirus humain

Mise à jour
13/11/2024Autres dénominations
HPVInformations relatives à
CHUV / Toutes spécialités

Epidémiologie

Agent infectieux

Virus du papillome humain (plusieurs dizaines de génotypes)

Réservoir

Homme

Mode de transmission



Par contact direct



Par l'intermédiaire d'objets, de dispositifs médicaux contaminés



Transmission verticale lors de l'accouchement



Potentiellement par des fumées induites par des dispositifs d'électrocautérisation, bistouri à ultrasons, laser, etc.

Période d'incubation

2 à 3 mois

Durée d'infectiosité

Aussi longtemps que l'infection est présente

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles



L'application des Précautions Standard est suffisante pour les soins usuels

Autre



En cas de procédure induisant la génération de fumées chirurgicales (p.ex. traitement laser de condylomes) : travailler dans une salle avec ventilation mécanique suffisante et utiliser un système d'aspiration des fumées au plus près du site d'émission avec un dispositif de captage adapté



Le masque FFP2 est nécessaire en cas d'absence d'aspiration efficace et de ventilation insuffisante mais ne protège pas contre les gaz et vapeurs des fumées chirurgicales



Pour plus d'informations, veuillez vous référer au document SUVA « [Factsheet Fumées chirurgicales – Risques et mesures de protection](#) »

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains



Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique

Gants



Si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée

Blouse de protection



Si risque de projections de liquides biologiques

Masque de soins



Si procédure de type chirurgical induisant la génération de fumées nécessitant un masque FFP2 (cf « [Factsheet Fumées chirurgicales – Risques et mesures de protection](#) »)



Ou selon les Précautions Standard (si risque de projections de liquides biologiques ou lors de symptômes respiratoires)

Lunettes de protection



Si risque de projections de liquides biologiques

Nettoyage et désinfection

Matériel de soins



Utiliser le détergent/désinfectant usuel



Retraiter le matériel à usage multiple après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque

Lit et literie



Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre



Utiliser les sacs à linge usuels



Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité

Environnement



Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien



Entretien de l'environnement direct du patient 1x par jour



Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement

Déchets



Elimination des déchets selon les filières habituelles
