HPCi | hygiène, prévention et contrôle de l'infection

Papillomavirus humain

Mise à jour
13/11/2024

Autres dénominations
HPV

Informations relatives à
CHUV / Soins intensifs

Epidémiologie

Agent infectieux

- Virus du papillome humain (plusieurs dizaines de génotypes)

Réservoir

- Homme

Mode de transmission

- Par contact direct
- Par l'intermédiaire d'objets, de dispositifs médicaux contaminés
- Transmission verticale lors de l'accouchement

- Potentiellement par des fumées induites par des dispositifs d’électrocautérisation, bistouri à ultrasons, laser, etc.

Période d'incubation

- 2 à 3 mois

Durée d'infectiosité

- Aussi longtemps que l'infection est présente

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

- L'application des Précautions Standard est suffisante pour les soins usuels

Autre

- En cas de procédure induisant la génération de fumées chirurgicales (p.ex. traitement laser de condylomes) : travailler dans une salle avec ventilation mécanique suffisante et utiliser un système d’aspiration des fumées au plus près du site d’émission avec un dispositif de captage adapté
- Le masque FFP2 est nécessaire en cas d’absence d’aspiration efficace et de ventilation insuffisante mais ne protège pas contre les gaz et vapeurs des fumées chirurgicales

- Pour plus informations, veuillez vous référer au document SUVA « Factsheet Fumées chirurgicales – Risques et mesures de protection »

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains

- Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique

Gants

- Si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée

Blouse de protection

- Si risque de projections de liquides biologiques

Masque de soins

- Si procédure de type chirurgical induisant la génération de fumées nécessitant un masque FFP2 (cf « Factsheet Fumées chirurgicales – Risques et mesures de protection »)
- Ou selon les Précautions Standard (si risque de projections de liquides biologiques ou lors de symptômes respiratoires)

Lunettes de protection

- Si risque de projections de liquides biologiques

Nettoyage et désinfection

Matériel de soins

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel
- Retraiter le matériel à usage multiple après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque

Lit et literie

- Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
- Utiliser les sacs à linge usuels
- Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité

Environnement

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
- Entretien de l'environnement direct du patient 1x par jour
- Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement

Déchets

- Elimination des déchets selon les filières habituelles