HPCi | hygiène, prévention et contrôle de l'infection

Tuberculose latente

PS

Mise à jour
17/11/2026

Informations relatives à
CHUV / Bloc opératoire

Epidémiologie

Agent infectieux

Mycobacterium tuberculosis

Réservoir

Homme

Mode de transmission

La tuberculose **latente** n'est pas une forme contagieuse

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard et Mesures Additionnelles

Aucune, application des Précautions Standard

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains

Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique

Gants

Si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée

Blouse de protection

Si risque de projections de liquides biologiques

Masque de soins

Si risque de projections de liquides biologiques

- Lors de symptômes respiratoires

Lunettes de protection

- Si risque de projections de liquides biologiques

Nettoyage et désinfection

Matériel de soins

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel
- Retraiter le matériel à usage multiple après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque

Lit et literie

- Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
- Utiliser les sacs à linge usuels
- Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité

Environnement

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
- Entretien de l'environnement direct du patient 1x par jour

- Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement

Déchets

- Elimination des déchets selon les filières habituelles