

Infections à Streptocoques pyogènes du groupe A



Mise à jour
12/11/2024

Informations relatives à
Hôpitaux FHV, Cliniques, CTR / Dialyse

Epidémiologie

Agent infectieux

Streptococcus pyogenes du groupe A

Réservoir

Homme

Mode de transmission



Par contact direct ou indirect (transmission manuportée). Les patients infectés ou porteurs asymptomatiques (nez, gorge, anus, vagin) peuvent être à l'origine d'infections nosocomiales ou de contamination alimentaire

- Transmission par des gouttelettes, particules de grosse dimension (> 5 microns), dont la production est exacerbée par la toux, la conversation, certaines interventions: ex. bronchoscopie
 - La dispersion de gouttelettes se limite à un rayon de 1 à 2 mètres depuis la source
 - Les mains ou les gants contaminés par les gouttelettes peuvent aussi être un vecteur
 - Portes d'entrée: muqueuses (bouche, nez, gorge)
 - Transmission materno-foetale
-

Période d'incubation

1 à 3 jours, rarement plus

Durée d'infectiosité

- 24 heures après l'introduction d'un traitement antibiotique adéquat
- 10 à 21 jours en l'absence de traitement pour les cas simples, plusieurs semaines à mois si lésions purulentes non traitées

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

- L'application des Précautions standard est suffisante.
- Si **plaie/écoulement difficile à contenir** dans un pansement, instaurer des **Mesures Additionnelles CONTACT** lors des soins en chambre et maintien en chambre durant 24h après instauration d'un traitement antibiotique adéquat.
- Si **pneumonie, pharyngite**, instaurer des **Mesures Additionnelles GOUTTELETTES** durant 24h après instauration d'un traitement antibiotique

Placement

- Chambre individuelle idéalement si impossible isolement géographique :
 - Mesures Additionnelles GOUTTELETTES: Maintien en chambre durant 24h après instauration d'un traitement antibiotique adéquat
 - Mesures Additionnelles CONTACT
-

Signalétique

- Si Mesures Additionnelles:
 - Affiche sur la porte à l'extérieur de la chambre (entrée) et intérieur (sortie)
 - Blouses/ masques de soins devant la chambre ou dans le SAS
 - Aux soins intensifs/continus, si pas de box disponible, délimiter le périmètre d'isolement géographique
 - Avant intervention chirurgicale: Communiquer au bloc opératoire les Mesures Additionnelles
-

Matériel de soins

- Réservé au patient pendant la durée de la maladie
- Privilégier le matériel à usage unique.

- Désinfection rigoureuse du matériel à usage multiple (stéthoscope, brassard à pressions, glucomètre, saturemètre, etc)
-

Transport

- Si Mesures Additionnelles Gouttelettes:
- Port d'un masque de soins par le patient
 - Literie et chemise du patient propres
 - Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates
 - Limiter les déplacements aux besoins essentiels
- Si Mesures Additionnelles Contact:
- Literie et chemise du patient propres
 - Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates
 - Limiter les déplacements aux besoins essentiels
-

Visiteurs

- Ne pas s'asseoir sur le lit
 - Désinfection des mains en sortant de la chambre
 - Si Mesures Additionnelles Gouttelettes:
 - Port d'un masque de soins
-

Autre

Ces mesures s'appliquent uniquement en cas d'infection invasives à Streptocoques

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains

Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydro-alcoolique (PHA)

Gants

- Non indiqués en systématique
 - A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)
-

Blouse de protection

- Si Mesures Additionnelles :
 - Oui, si contact direct avec le patient ou son environnement immédiat
 - Pas nécessaire si simple passage dans la chambre
-

Masque de soins

- Si Mesures Additionnelles Gouttelettes:

-  Masque de soins lorsque le travail s'effectue dans un rayon de 1 à 2 mètres du patient.
 -  Pas nécessaire pour un simple passage en chambre.
-

Lunettes de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins

-  Dispositifs médicaux a usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque
 -  Vaisselle : filière habituelle
-

Lit et literie

-  Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
 -  Utiliser les sacs à linge usuels
 -  A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient:
 -  désinfecter le lit et changer la literie
-

Environnement

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
 - A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient:
 - Désinfection minutieuse de l'environnement direct du patient (table de nuit, statif, perfusomat, etc.)
 - Idéalement, changement de rideau de séparation à la sortie du patient
 - Si paravent: nettoyage au quotidien
-

Déchets

Élimination des déchets selon les filières habituelles

Déclaration du cas

Déclaration au service HPCI

Oui
