

Infections à Streptocoques pyogènes du groupe A



Mise à jour
12/11/2024

Informations relatives à
Hôpitaux FHV, Cliniques, CTR / Stérilisation

Epidémiologie

Agent infectieux

Streptococcus pyogenes du groupe A

Réservoir

Homme

Mode de transmission



Par contact direct ou indirect (transmission manuportée). Les patients infectés ou porteurs asymptomatiques (nez, gorge, anus, vagin) peuvent être à l'origine d'infections nosocomiales ou de contamination alimentaire

-  Transmission par des gouttelettes, particules de grosse dimension (> 5 microns), dont la production est exacerbée par la toux, la conversation, certaines interventions: ex. bronchoscopie
 -  La dispersion de gouttelettes se limite à un rayon de 1 à 2 mètres depuis la source
 -  Les mains ou les gants contaminés par les gouttelettes peuvent aussi être un vecteur
 -  Portes d'entrée: muqueuses (bouche, nez, gorge)
 -  Transmission materno-foetale
-

Période d'incubation

1 à 3 jours, rarement plus

Durée d'infectiosité

-  24 heures après l'introduction d'un traitement antibiotique adéquat
 -  10 à 21 jours en l'absence de traitement pour les cas simples, plusieurs semaines à mois si lésions purulentes non traitées
-

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

-  L'application des Précautions standard est suffisante.
-  Si **plaie/écoulement difficile à contenir** dans un pansement, instaurer des **Mesures Additionnelles CONTACT** lors des soins en chambre et maintien en chambre durant 24h après instauration d'un traitement antibiotique adéquat.
-  Si **pneumonie, pharyngite**, instaurer des **Mesures Additionnelles GOUTTELETES** durant 24h après instauration d'un traitement antibiotique

Placement

- Chambre individuelle idéalement si impossible isolement géographique :
 - Mesures Additionnelles GOUTTELETES: Maintien en chambre durant 24h après instauration d'un traitement antibiotique adéquat
 - Mesures Additionnelles CONTACT
-

Signalétique

- Si Mesures Additionnelles:
 - Affiche sur la porte à l'extérieur de la chambre (entrée) et intérieur (sortie)
 - Blouses/ masques de soins devant la chambre ou dans le SAS
 - Aux soins intensifs/continus, si pas de box disponible, délimiter le périmètre d'isolement géographique
 - Avant intervention chirurgicale: Communiquer au bloc opératoire les Mesures Additionnelles
-

Matériel de soins

- Réservé au patient pendant la durée de la maladie
- Privilégier le matériel à usage unique.

- Désinfection rigoureuse du matériel à usage multiple (stéthoscope, brassard à pressions, glucomètre, saturomètre, etc)
-

Transport

➤ Si **Mesures Additionnelles Gouttelettes**:

- Port d'un masque de soins par le patient
- Literie et chemise du patient propres
- Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates
- Limiter les déplacements aux besoins essentiels

➤ Si **Mesures Additionnelles Contact**:

- Literie et chemise du patient propres
 - Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates
 - Limiter les déplacements aux besoins essentiels
-

Visiteurs

- Ne pas s'asseoir sur le lit
 - Désinfection des mains en sortant de la chambre
 - Si **Mesures Additionnelles Gouttelettes**:
 - Port d'un masque de soins
-

Autre

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains

Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydro-alcoolique (PHA)

Gants

-  Non indiqués en systématique
 -  A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)
-

Blouse de protection

-  Si Mesures Additionnelles :
 -  Oui, si contact direct avec le patient ou son environnement immédiat
 -  Pas nécessaire si simple passage dans la chambre
-

Masque de soins

-  Si Mesures Additionnelles Gouttelettes:



Masque de soins lorsque le travail s'effectue dans un rayon de 1 à 2 mètres du patient.



Pas nécessaire pour un simple passage en chambre.

Lunettes de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins



Dispositifs médicaux a usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque



Vaisselle : filière habituelle

Lit et literie



Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre



Utiliser les sacs à linge usuels



A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient:



désinfecter le lit et changer la literie

Environnement

-  Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
 -  A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient:
 -  Désinfection minutieuse de l'environnement direct du patient (table de nuit, statif, perfusomat, etc.)
 -  Idéalement, changement de rideau de separation a la sortie du patient
 -  Si paravent: nettoyage au quotidien
-

Déchets

Élimination des déchets selon les filières habituelles

Déclaration du cas

Déclaration au service HPCI

Oui
