

Infections à Streptocoques pyogènes du groupe A



Mise à jour
12/11/2024

Informations relatives à
Cabinets et polycliniques / Médical

Epidémiologie

Agent infectieux

Streptococcus pyogenes du groupe A

Réservoir

Homme

Mode de transmission



Par contact direct ou indirect (transmission manuportée). Les patients infectés ou porteurs asymptomatiques (nez, gorge, anus, vagin) peuvent être à l'origine d'infections nosocomiales ou de contamination alimentaire

-  Transmission par des gouttelettes, particules de grosse dimension (> 5 microns), dont la production est exacerbée par la toux, la conversation, certaines interventions: ex. bronchoscopie
 -  La dispersion de gouttelettes se limite à un rayon de 1 à 2 mètres depuis la source
 -  Les mains ou les gants contaminés par les gouttelettes peuvent aussi être un vecteur
 -  Portes d'entrée: muqueuses (bouche, nez, gorge)
 -  Transmission materno-foetale
-

Période d'incubation

1 à 3 jours, rarement plus

Durée d'infectiosité

-  24 heures après l'introduction d'un traitement antibiotique adéquat
-  10 à 21 jours en l'absence de traitement pour les cas simples, plusieurs semaines à mois si lésions purulentes non traitées

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

-  Mesures Additionnelles Gouttelettes uniquement lors de maladies invasive à *Streptococcus pyogenes* du groupe A (pharyngite, angine, scarlatine).

- En présence d'infection localisée (plaie, endométrite, etc), l'application des Précautions Standard est suffisante.
-

Placement

- Si Mesures Additionnelles Gouttelettes (pneumonie, pharyngite)
 - Mise à l'écart en attente de la consultation
 - Si passage en salle d'attente:
 - faire porter un masque au patient
 - Ces mesures s'appliquent uniquement lors de maladies invasive à *Streptococcus pyogenes* du groupe A. En présence d'infection localisée (plaie, endométrite, etc), l'application des Précautions Standard est suffisante.
-

Durée des mesures

24 heures après l'introduction d'un traitement antibiotique adéquat

Matériel de soins

- Privilégier le matériel à usage unique (UU)
 - Désinfection rigoureuse du matériel à usage multiple (stéthoscope, brassard à pressions, glucomètre, saturomètre, etc)
-

Transport

 Si Mesures Additionnelles Gouttelettes suite à une maladie invasive à *Streptococcus pyogenes* du groupe A:

 Port d'un masque de soins par le patient

 Avertir le service/établissement de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates

Autre

Ces mesures s'appliquent uniquement lors de maladies invasive à *Streptococcus pyogenes* du groupe A. En présence d'infection localisée (plaie, endométrite, etc), l'application des Précautions Standard est suffisante.

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Masque de soins

 Si Mesures additionnelles Gouttelettes:

 Masque de soins lorsque le travail s'effectue dans un périmètre de 1-2 mètre du patient.

 Pas nécessaire si simple passage en salle de consultation

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins



Utiliser le détergent/désinfectant usuel

A la levée des Mesures Additionnelles :



Désinfecter tout le matériel à usage multiple présent en chambre



Éliminer le matériel non désinfectable (boîtes de gants, masques, lingettes, etc) présent dans la zone patient (< 2 m)



Conserver le matériel non désinfectable (boîtes de gants, masques, lingettes, etc) présent hors de la zone patient (> 2 m) sauf si souillures visibles

Déchets

Élimination des déchets selon les filières habituelles
