

Infections à Streptocoques pyogènes du groupe A



Mise à jour
12/11/2024

Informations relatives à
Cabinets et polycliniques / Dialyse ambulatoire

Epidémiologie

Agent infectieux

Streptococcus pyogenes du groupe A

Réservoir

Homme

Mode de transmission



Par contact direct ou indirect (transmission manuportée). Les patients infectés ou porteurs asymptomatiques (nez, gorge, anus, vagin) peuvent être à l'origine d'infections nosocomiales ou de contamination alimentaire

-  Transmission par des gouttelettes, particules de grosse dimension (> 5 microns), dont la production est exacerbée par la toux, la conversation, certaines interventions: ex. bronchoscopie
 -  La dispersion de gouttelettes se limite à un rayon de 1 à 2 mètres depuis la source
 -  Les mains ou les gants contaminés par les gouttelettes peuvent aussi être un vecteur
 -  Portes d'entrée: muqueuses (bouche, nez, gorge)
 -  Transmission materno-foetale
-

Période d'incubation

1 à 3 jours, rarement plus

Durée d'infectiosité

-  24 heures après l'introduction d'un traitement antibiotique adéquat
 -  10 à 21 jours en l'absence de traitement pour les cas simples, plusieurs semaines à mois si lésions purulentes non traitées
-

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

-  Mesures Additionnelles Gouttelettes uniquement lors de maladies invasive à *Streptococcus pyogenes* du groupe A (pharyngite, angine, scarlatine).



En présence d'infection localisée (plaie, endométrite, etc), l'application des Précautions Standard est suffisante.

Placement



Si Mesures Additionnelles Gouttelettes (pneumonie, pharyngite)



Mise à l'écart en attente de la consultation



Si passage en salle d'attente:



faire porter un masque au patient



Ces mesures s'appliquent uniquement lors de maladies invasive à *Streptococcus pyogenes* du groupe A. En présence d'infection localisée (plaie, endométrite, etc), l'application des Précautions Standard est suffisante.

Durée des mesures

24 heures après l'introduction d'un traitement antibiotique adéquat

Matériel de soins



Privilégier le matériel à usage unique (UU)



Désinfection rigoureuse du matériel à usage multiple (stéthoscope, brassard à pressions, glucomètre, saturomètre, etc)

Transport



Si Mesures Additionnelles Gouttelettes suite à une maladie invasive à *Streptococcus pyogenes* du groupe A:



Port d'un masque de soins par le patient



Avertir le service/établissement de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates

Autre

Ces mesures s'appliquent uniquement lors de maladies invasive à *Streptococcus pyogenes* du groupe A. En présence d'infection localisée (plaie, endométrite, etc), l'application des Précautions Standard est suffisante.

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Masque de soins



Si Mesures additionnelles Gouttelettes:



Masque de soins lorsque le travail s'effectue dans un périmètre de 1-2 mètre du patient.



Pas nécessaire si simple passage en salle de consultation

Nettoyage/désinfection

Déchets

Élimination des déchets selon les filières habituelles
