HPCi | hygiène, prévention et contrôle de l'infection

# Acinetobacter spp. multirésistant






Mise à jour
20/10/2026

Informations relatives à
CHUV / Soins intensifs

## Epidémiologie

### Agent infectieux

- *Acinetobacter baumannii, Acinetobacter nosocomialis, Acinetobacter pittii* (autres espèces peu ou pas responsables d'infections cliniques)
- *Acinetobacter* spp est une bactérie opportuniste. La majorité des épidémies décrites sont dues à *Acinetobacter baumannii* et touchent surtout des patients d'unités de soins intensifs, en particulier des grands brûlés
- *Acinetobacter* spp multiresistant: germe résistant à au moins un antibiotique dans au moins 3 classes d'antibiotiques habituellement efficaces

### Réservoir

- Environnement: *Acinetobacter* spp peut survivre plusieurs jours sur des surfaces inertes
- peut faire partie de la flore résidente cutanée, des voies respiratoires supérieures ou des voies génitales

## Mode de transmission

- par contact direct entre patients
- par l'intermédiaire du personnel (mains)
- par contact indirect (matériel de soins ou d'examens, instruments, environnement immédiat)

## Période d'incubation

Variable

## Durée d'infectiosité

Aussi longtemps qu'une personne est infectée ou colonisée par le germe

# Prise en charge du cas positif/suspect

## Précautions Standard + Mesures Additionnelles

Pour les Acinetobacter producteurs de carbapénémase, voir la fiche carbapénémase

**Hospitalisation :**

- Mesures Additionnelles Contact si infection active (infection de plaie, urines, etc.) / Mesures Additionnelles Gouttelettes si infection respiratoire ou port de trachéostomie
- Voir fiche ci-dessous

**Ambulatoire interventionnel :**

- Mesures Additionnelles Contact si infection active (infection de plaie, urines, etc.) / Mesures Additionnelles Gouttelettes si infection respiratoire ou port de trachéostomie
- Voir tableau synthétique secteurs ambulatoires interventionnels

**Ambulatoire non interventionnel :**

- Précautions Standard
- Voir tableau synthétique secteurs ambulatoires non interventionnels

## Placement

- Chambre individuelle pendant la durée de l'infection

## Durée des mesures

- Maintenir les Mesures Additionnelles pendant la durée de l'infection
- Situation particulière: un patient brûlé hébergé aux soins intensifs sera considéré infectieux pendant tout le séjour aux soins intensifs

## Signalétique

- Affiche A3 pour les visiteurs et affiche "entrée Mesures Additionnelles" sur la porte à l'extérieur de la chambre
- Chariot d'isolement avec surblouses (+ masques de soins si Mesures Additionnelles Gouttelettes) devant la chambre
- Affiche "sortie Mesures Additionnelles" sur la porte à l’intérieur de la chambre
- Plaquette sur la potence du lit, à transférer sur la chaise lors de transport
- Aux soins intensifs/continus, si pas de box disponible, délimiter avec du ruban adhésif rouge le périmètre d’isolement

- Avant intervention chirurgicale, indiquer les Mesures Additionnelles dans Digistat

## Suivi microbiologique

- Prélèvement de suivi par nécessaire

## Soins de base

- En cas de douche commune, le patient en Mesures Additionnelles passe en dernier

## Matériel de soins

- Le matériel de soins est réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles
- Privilégier le matériel à usage unique

## Transport

- Si Mesures Additionnelles Gouttelettes : masque de soins pour le patient et le transporteur
- Toilette corporelle du jour réalisée, chemise d'hôpital propre, protections changées si incontinence, pansements hermétiques et non souillés si plaies, désinfection des mains
- Si transfert en chaise, y suspendre la plaquette de la potence du lit
- Surblouse et gants pas nécessaires pour le patient et le transporteur

- Désinfection du pourtour du lit et des accessoires (pompes à perfusion, chaise roulante) avant de sortir de la chambre
- Limiter les déplacements aux besoins essentiels

## Circulation du patient

- Sorties limitées à la physiothérapie de mobilisation et aux besoins essentiels. Lors d'hospitalisation prolongée et si patient compliant, possibilité de sorties au BH 08 ou à l'extérieur
- Toilette corporelle du jour réalisée, chemise d'hôpital propre, protections changées si incontinence, pansements hermétiques et non souillés si plaies, désinfection des mains
- Le fauteuil du patient ou tout autre dispositif est désinfecté au moyen d'une lingette imprégnée d'alcool ou de détergent/désinfectant avant la sortie de la chambre
- Si Mesures Additionnelles Gouttelettes : masque de soins pour le patient et le transporteur
- Surblouse et gants pas nécessaires pour le patient
- Surblouse indiquée pour le soignant seulement si contact direct avec le patient

## Visiteurs

- Ne pas s'asseoir sur le lit
- Désinfection des mains en sortant de la chambre
- Surblouse seulement si participation aux soins
- Si Mesures Additionnelles Gouttelettes : masque de soins

## Transfert/Sortie

- Avertir le service/l'établissement de soins de destination

## Autres recommandations

- Si nouveau cas : distribuer la brochure d'information au patient

## Mesures en cas d'épidémie

- Cohortage possible lors d'épidémie
- Se référer aux recommandations de l'unité HPCi-CHUV

# Mesures de protection/prévention pour le personnel

## Hygiène des mains

- Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique

## Gants

- Non indiqués en systématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

## Blouse de protection

- Oui, si contact direct avec le patient ou son environnement immédiat
- Pas nécessaire si simple passage dans la chambre

## Masque de soins

- Non, sauf si Mesures Additionnelles Gouttelettes
- Ou selon les indications des Précautions Standard (risque de projections de liquides biologiques ou lors de symptômes respiratoires)

## Lunettes de protection

- Non en systématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (risque de projections de liquides biologiques)

# Nettoyage/désinfection

## Matériel de soins

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel

**A la levée des Mesures Additionnelles :**

- Désinfecter tout le matériel à usage multiple présent en chambre
- Eliminer le matériel non désinfectable (boites de gants, masques, lingettes, etc) présent dans la zone patient (<2m)

- Conserver le matériel non désinfectable (boites de gants, masques, lingettes, etc) présent hors de la zone patient (>2 m, sauf si souillures visibles

## Lit et literie

- Se désinfecter les mains avant toute manipulation de linge propre
- Utiliser les sacs à linge usuels
- Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité

**A la levée des Mesures Additionnelles :**

- Changer le lit et la literie

## Environnement

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
- Entretien de l'environnement direct du patient 1x par jour
- Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement

**A la levée des Mesures Additionnelles :**

- Désinfection minutieuse de l'environnement direct du patient (table de nuit, armoire patient, etc.)
- Nettoyage et désinfection de la chambre par le service propreté et hygiène
- Changement du rideau de lit ou nettoyage de la surface du paravent
- Trempage du rideau de la salle de bains

# Déchets

- Elimination des déchets selon les filières habituelles